



API d'ETE (2)

©2001-2007-fichier choisel.



Mas, Le Verger, n°25, t.5, 1858

ORIGINE: France, avant 1790. Cité pour la 1ère. fois dans le catalogue de Pierre Leroy (aieul de André Leroy), en 1790. Cultivé avant 1800 dans les pépinières C.R.Maréchal à Metz.

SYNONYMES: Api Rouge d'Été (Diel 1809, Mas 1868-), Rother Sommer Api (Mas 1868), Cardinal d'Été (Pierre Leroy 1790). A comparer avec Cardinal de Juillet.

MATURITE.CONSUMMATION: Mi août .courant septembre.

FORME: Moyenne à moins, sphéroïdale très aplatie, plus large, asymétrique, (Leroy écrit: et quelque peu pentagonale).

EPIDERME: Très onctueux, (à peau mince),lisse, à fond jaune clair, en partie ou tout lavé de rouge vif brillant sur lequel existent quelques lenticelles fines, grises, peu évidentes.

CUVETTE du PEDONCULE: Evasée, large à moyenne, profonde à moyenne.

PEDONCULE: Gros et court un peu charnu à la base, ou souvent il est bosselé (critère gibbosité vers pédoncule).Ne dépasse pas le sommet, sinon peu.

CUVETTE de L'ŒIL: Large, assez profonde, plissée.

ŒIL: Très grand, mi clos à larges sépales.

CHAIR: Blanchâtre, ferme, juteuse, sucrée, peu parfumée, douce..



LOGES à PEPINS: Closes, un peu feutrées

Diel Lucas

CARACTERES PARTICULIERS: Eventuelle bosse à la base du pédoncule.

OBSERVATIONS: Arbre vigoureux. Lenticelles sur rameaux petites et très nombreuses. Yeux un peu écartés de l'écorce.

REFERENCES: Pierre Leroy, Catalogue 1790, Angers, page 25. Diel, Kernobstsorten, 1809, ., tome 10, page 45, (Diel à reçu cette variété de Maréchal à Metz, en 1800. Oberdieck, 1859, Illustriertes Handbuch der Obstkunde, Allemagne, tome 1, n°95, page 221. Mas Le Verger, 1868. 1868, tome 5, Pommes Précoces, n°25. A. Leroy, tome 3, 1873, Dictionnaire de Pomologie, n°11. Diel, Lucas, Oberdieck.