



BARBE

©fichier choisel-2002-2012



ORIGINE : Cultivée avant 1926(1^{er} congrès de la pomme de table , 1926) dans la Drôme(dans le Royans et la région de Crest) , l'Isère , l'Ardèche. Décrite en 1927 par la Sté pomologique de France et en 1934 par J.Vercier.



Pastel choisel jean-louis 2012 ©

SYNONYMES : Courby , Courbis , Pomme Barbe.

MATURITE-CONSOMMATION : Décembre-Mai.

FORME : Moyenne. Plus large sphéroïdale (Sté pomologique) , conique(Vercier) , pourtour variable souvent irrégulier voire même côtelé pour Vercier et régulier pour la Sté Pomologique.

EPIDERME : Lisse , mi épais , brillant , jaune plus ou moins frappé de rouge vif uni ou de rose. Parfois traces fauves. Lenticelles grosses , blanchâtres et grises.

CUVETTE du PEDONCULE : Mi étroite , profondeur moyenne , irrégulière , fauve.

PEDONCULE : Gros à fin , longueur variable , plus gros à l'attache.

CUVETTE de L'ŒIL : Peu profonde , large, plissée , côtelée

L'ŒIL : Petit à grand , clos ou mi clos. Longs sépales.

CHAIR : Blanc verdâtre avec filaments verts , mi tendre , mi juteuse , acidulée , sucrée. A deux fins.

CARACTERES SPECIAL : non;

OBSERVATIONS : Pour altitude. Floraison tardive.

REFERENCES : Choisel.

BIBLIOGRAPHIE : Catalogue Sté pomologique de France , 1927 - J.Vercier , 1934 , p.265.