



BARON DE BERLEPSCH

Vue H.Kessler , 1949.



©2002-2013-fichier choisel.



vue Oberdieck et Lucas, 1901, Monatshefte.

ORIGINE : Croisement allemand de Reinette Ananas avec Ribston Pippin vers 1880.
Conservée à Brogdale (the book of apples ; 1993 ; p.210)

SYNONYMES : Freiherr von Berlepsch - Berlepsch - Berlepsch Goldreinette, Berlepsch Gelb. Il existe un type Berlepsh rouge(plus rouge) crée en 1950(voir : 100 variétés de fruits , 1983 , Station fédérale agronomique de Changins , Suisse , p.72 , 73).
Ne pas confondre avec Reinette Baumann, ni avec Bittenfelder.

MATURITE-CONSOMMATION : Novembre-fin mars (en frigo : jusqu'en fin février à 0-2° pour le type plus récent).

FORME : Moyenne , H=60mm , L=70mm. Plus large , sphéroïdale plat avec côtes bien visibles et typiques côté œil. Peut paraître faussement conique.

EPIDERME : Lisse mais un peu rugueuse par endroits à cause de légères traces fauves. Fond jaune-verdâtre lavé et strié de rouge-brun typique , sur 3/4 à tout. Lenticelles petites , nombreuses fauve clair mais peu évidentes (moins que sur le type plus récent).

CUVETTE du PEDONCULE : Dimensions moyennes mais largeur pouvant diminuer, fauve rayonnant.

PEDONCULE : Gros à moyen , ligneux , dessus en bouton , porte des éperons , court , ne dépasse pas le sommet.

CUVETTE de L'ŒIL : Largeur moyenne , plissée , bien côtelée (5 côtes) , peu profonde , traces fauves.

L'ŒIL : Moyen , clos ou mi clos.

CHAIR : Blanc jaunâtre , ferme , bien juteuse , acidulée , arôme typique prononcé.

LOGES à PEPINS : Grandes bien que plus hautes $L/H=11/10=1,1$, peu feutrées , closes.

REFERENCES : Choisel.

BIBLIOGRAPHIE : Vue H.Kessler , 1949 , Pomologie Illustrée , Fruit-Union suisse à Zoug., pp. 64, 65. Oberdieck et Lucas, 1901, Monats. Et voir texte.