


# BEDFORDSHIRE FOUNDLING

©2001-2008-fichier choisel.



Willermoz, 1863, Pomologie de la France.

**ORIGINE :** Comté de Bedford, Angleterre, en 1800. Première description en 1831 par Lindley. Introduite en Belgique vers 1840. Cultivée par A. Leroy d'Angers après 1867. En 1867, le pépiniériste Rouillé-Courbé de Tours en exposa d'énormes spécimens à Paris. Conservée à Brogdale (« The Book of Apples », 1993, p.186). Présente dans « Le Verger », Mas, 1868, t.4, n°2.

**SYNONYMES :** Cambridge Pippin (George Lindley, « Guide to the orchard and kitchen garden », 1831, p.63, n°120).- Mignonne de Bedford (Alexandre Bivort, « Album de pomologie belge », 1850, t.III, p.35),  
Ne pas confondre avec Reinette du Canada (Rambour de Paris).

**MATURITE-CONSOMMATION :** Décembre-Mars.

**FORME :** Très grosse, L=90mm., H=76mm.- Plus large, conique, côtelé surtout côté cuvette œil.

**EPIDERME** : Lisse , jaune clair brillant , unicolore, faiblement nuancé de vert autour du pédoncule. Assez grosses et nombreuses lenticelles brun-gris. Pour J.Vercier : frappé de rose et de rouge sombre uni plutôt que strié. Pour Hedemij voir gravure couleur de gauche. Pour Alexandre Bivort(Annales de pomologie on voit quelques stries) et « ..à la maturité se colore d'un jaune orange côté soleil ou il est aussi ponctué et panaché de carmin vif. A.Leroy a-t-il décrit le bon clone ?

**CUVETTE du PEDONCULE** : Large, évasée, profonde, faiblement nuancé de vert. Pour Vercier : voilé de gris-brun. Pour N.Gaucher : fauve.

**PEDONCULE** : Grêle et long, dépasse le sommet.

**CUVETTE de L'ŒIL** : Profonde, (étroite : Annales...), gibbeuse ou anguleuse. Ombrée de roux :(Annales de pomologie...). Fauve : (Nicolas Gaucher, 1894)

**L'ŒIL** : Grand, mi clos ou clos, duveteux. Ouvert(Annales...).

**CHAIR** : Blanchâtre (blanc jaunâtre : Annales)(jaunâtre : N.Gaucher), fine, tendre, odorante, croquante, bien juteuse, sucrée, d'un acide(d'un léger aigret : Annales...) bien agréable. Première qualité.

**LOGES à PEPINS** : Hautes, assez larges, mi ouvertes à closes, bien feutrées ou



fendillées

Oberdieck n° 309, 1865, Illustr..

**OBSERVATIONS** : Arbre très vigoureux aux rameaux très cotonneux à lenticelles grandes assez proches. Pétiole très gros et assez long. Pour Nicolas Gaucher, 1894: Peu répandue en Allemagne , pourtant de valeur .Ressemble à Reinette du Canada(Rambour de Paris) mais plus résistante au carpocapse.

**REFERENCES** : Recherches Choisel J.Louis.

**BIBLIOGRAPHIE** : A.Bivort, « Annales de pomologie belge et étrangère », 1853/60, Bruxelles, t.6, p.69, et réédition 1998, p.640/42, pl.641.- J.Vercier, 1934.- Nicolas Gaucher , 1894, Stuttgart , Pomologie de l'Arboriculteur.Wuillermoz, 1863,Pomologie de la France,vol.1 -A.Leroy, Angers, 1873, « Dictionnaire de Pomologie », n°33, silhouette ici.- Heidemij, 1868, « De Nederlandsche Boomguard »pl.43, n°84 (gravure).Et Oberdieck 1865.