



**BELLE FLEUR(2)** (Eté-Hiver).R.Touraine- de France.

© 1997-2002-fichier choisel jean-louis.

**ORIGINE:**Une Belle Fleur fut décrite en 1670 par le moine Claude Saint-Etienne dans : Nouvelle instruction pour connaître les bons fruits, pages 207 et 211. On ne sait pas si elle correspond avec celle décrite ici.Celle décrite par Poiteau en 1846 "Pomologie Française", T.4, n°31(gravure ici,en haut à droite) ne semble pas avoir l'accord de Leroy en tant que rapprochement, par Poiteau, avec De Boutigné qui serait Calleville Rose(d'après Leroy). Donc la Belle Fleur décrite par Poiteau est néanmoins celle approuvée par Leroy en tant que telle et trouvée par le père de Noisette dans la forêt de Sénard, Seine et Oise, en fin du 18<sup>e</sup> siècle.

J'ai réussi à identifier cette variété dans le verger de Raymond Jahan,en Touraine le 16/08/1997.(ma photo et deux coupes en haut à gauche)(la silhouette au milieu est de A.Leroy).

**SYNONYMES:** Ne pas confondre avec Belle Fleur Rouge(Red Belle Fleur) des Américains, ni avec d'autre très répandues par ailleurs.

Premières citations: Belle Fleur d'Eté(John Turner, Transactions of the hoticultural Society of London, 1820, t.4, p.278.).-Belle d'Août(Louis Noisette, Le jardin fruitier,1839, t.1,p.197,n°11, cultivée depuis environ 1794, dans les pépinières Noisette. Inconnue de Duhamel en 1768).-Belle Flower dans les pépinières de Tours et D'Angers, 1845-1855, et appartenant probablement à André Leroy. C'est probablement la raison dela présence de la variété en Touraine encore actuellement.

**MATURITE.CONSOMMATION:** Mi septembre-Octobre, pouvant se prolonger en février.

**FORME:** L=70mm., H=74mm.ou plus grosse.Donc, plus haute, cônique-allongée

**EPIDERME:** Lisse, peau mince, jaune clair et verdâtre, lavé de rose à l'insolation et, surtout, plus ou moins tacheté ou un peu lavé de rouge cerise (1/2)et strié du même rouge, mais plus foncé. Lenticelles grises peu évidentes.

**CUVETTE du PEDONCULE:** Etroite à moyenne, profonde, gris-vert.

PEDONCULE: Un peu grêle à moyen, long à moyen, dépasse du sommet, courbe, renflé à l'attache.

CUVETTE de L'ŒIL: Etroite, peu profonde, plissée, bosselée.

ŒIL: Grand à moyen, clos ou mi clos.

CHAIR: Blanc-jaunâtre, fine, tendre, peu croquante, juteuse, sucrée, acidulée, bien parfumée.

LOGES à PEPINS:Hautes, bien feutrées, très ouvertes.Rares pépins ronds, brun clair. Parfois aucun.

OBSERVATIONS: Arbre vigoureux à rameaux très cotonneux, rouge-brun bien lavé de gris, à grandes et nombreuses lenticelles. Yeux gros, arrondis, duveteux, tout contre l'écorce. Feuilles à bords régulièrement dentelé, pétiole court, souvent sans cannelure.

REFERENCES: André Leroy, Dictionnaire de Pomologie, t;3, n°41, 1873,Angers,Paris.- Poiteau, Pomologie Française, 1846, t.4, n°31.- Choisel Jean-Louis étude de 1997, photos , coupes.©