



## BELLE DU BOIS

FICHER CHOISEL Jean-Louis, 36, rue Bel Air 37320.Saint-Branchs.©

ORIGINE: Inconnue,décrite pour la première fois par Louis Noisette, 1839, "Jardin Fruitier", t.1, p.201, n°30.Cultivée par André Leroy d'Angers en1841,nouveauté de son Catalogue,p.3.

SYNONYMES: Tout d'abord à ne pas confondre avec Joséphine, ni avec Ménagère, extrêmement ressemblantes(voir ces fiches).

Louis XVIII(A.Leroy, Catalogue de culture, 1846, p.20, et Alexandre Bivort, Album de pomologie belge, 1850, t.3,P.34-35).-Belle des Bois(d°).-Rhode-Island(d°).-Roi d'Island.- Belle de Dubois(Duval,Histoire du pommier et sa culture, 1852, p.53, n°21).-Reinette des Danois(Congrès pomologique,Pomologie de la France, 1867, t.4, n°47).- Rhode-Island Seedling(d°).- Rio, dans l'Indre.(encore en 1981 époque de mon étude sur ce fruit).

MATURITE.CONSOMMATION:Décembre.Mars.(Leroy).(novembre-mars pour Joséphine).

FORME: Très grosse à énorme. Deux formes:cônique surbaissée, L=112mm.,H=83mm..-cônique plu haute, L=100mm.,H=92mm.Plus large que haute, aplatie côté cuvette de l'œil, asymétrique.

EPIDERME: Unicolore, d'abord vert sombre devenant jaune-canari clair avec des lenticelles blanches, nombreuses,larges, qui deviennent brunes une fois que l'épiderme est jaune. Parfois léger voile lilas à l'insolation.

CUVETTE du PEDONCULE:Très large-évasée, très profonde, maculée d'une tache fauve foncé rayonnante mais irrégulière.

PEDONCULE: Très gros, très court.

CUVETTE de l'ŒIL: Très large, très profonde, à bords bien bosselés-plissée;Pas de fauve;

ŒIL: Grand, clos ou mi clos, parfois ouvert. Tube profond sous les sépales.

CHAIR: Blanche mais à peine verdâtre près des loges à pépins, un peu grenue(mi fine), mi croquante, juteuse encore verte, mais moins une fois farineuse à bonne maturité; acidulée, sucrée(Leroy= rarement bien sucrée. Cela pourrait être un manque de potasse), saveur agréable bien que sans parfum particulier. Meilleur moment de la croquer=lorsqu'elle est à la limite de sa verdeur et n'est pas encore passée au jaune(je parle de l'épiderme). La chair de cette variété est comparable à celle de Joséphine, alors que celle de Ménagère est moins bonne.

LOGES à PEPINS:Hautes, bien feutrées, ouvertes.

CARACTERES PARTICULIER: Son épiderme assez reconnaissable lorsqu'il est encore vert.

OBSERVATIONS: Arbre vigoureux à rameaux érigés, raides(ceux de Joséphine sont flexueux et brun foncé), bien duveteux, brun rouge et à lenticelles rares blanchâtres, très petites(Joséphine=petites,, très rapprochées). Yeux petits arrondis, duveteux, noyés dans l'écorce(Joséphine=gros, ovoïde-obtus, écartés de l'écorce, à écailles mal soudées, duveteuses). Feuilles à bords contournés, régulièrement crénelées à pétiole un peu grêle, raide, de longueur moyenne, en outre elles sont, contrairement à Joséphine, érigées, gaufrées ou plissées, (Joséphine= à bords fortement dentelés et surdentelés, pétiole court, très gros.

BIBLIOGRAPHIE: André Leroy, Angers, Dictionnaire de Pomologie, 1873, t.3, n°37.

REFERENCE : Etude Choisel J.L. ,1981,(Photos et coupe ici)©. Guide des Pommes,Choisel J.L., 1991, 1996,p.30; éditions Hervas, Paris.©