

BLANDUREAU

ORIGINE : Cultivée en Sud-Ouest(Gironde, Lot-et-garonne, Dordogne, Aveyron. Malgré des différences notamment la couleur de l'épiderme, E.Leterme dans « les fruits retrouvée », 1995, p.171, assimile BLANDUREAU à Blanc-Dureau décrite par Leroy en 1873(voir cette fiche en épiderme jaune), que lui même l'assimilait à Blanc Dure et Blanche Durette décrite par J.Bauhin en 1598(voir le mémoire « Les pommiers au Montbéliard....Jean Bauhin... », par Jean-Louis Choisel, bulletin de la Sté d'Emulation de Montbéliard, LXXXe volume-Fascicule n°107, 1984, publié en 1985-p.221 et 223, planches 1, n°2 et pl.2 n°10.Traduction des pages 62 et 63 de Historia fontis et balnei...., de 1598.) ;
VOIR aussi la fiche BLANC DUREAU.

Melle Leterme dans « les fruits retrouvés », 1995, page 193,cite la Blandurette de Corrèze connue sous les noms Pomme de Glace ou Reine des Glaces qui se scinde en trois types : la Grosse, le Petite, la Blanduretteà côtes. Elle la différencie de la BLANC DUREAU dont voici la description que j'ai pu également observer :
SYNONYMES : Redondelle, Rondelle Verte, dans le Sud-Ouest.

MATURITE-CONSOMMATION : Décembre-Mai.

FORME : Petite à moyenne. Plus large, sphéro-conique plat, asymétrique, pourtour assez régulier.

EPIDERME : Lisse, vert à jaune-verdâtre, voile orangé plus ou moins foncé à l'insolation.
Stries fauves

CUVETTE du PEDONCULE : Petite, fauve.
PEDONCULE : Long à mi long, dépasse ou non.

CUVETTE de L'ŒIL : Moyenne, un peu plissée.
ŒIL : Gros, ouvert.

CHAIR : Blanchâtre à verdâtre, ferme, sucrée, acidulée, un peu juteuse.

LOGES à PEPINS :Grande taille , feutrées.

OBSERVATIONS :

REFERENCES: Mémoire sur J.Bauhin de Jean-Louis Choisel , cité plus haut.

BIBLIOGRAPHIE : E.Leterme, voir plus haut.