



# CALVILLE D'ETE DE FRAAS.(nom selon Thomas, s.320, Guide Pratique, 19° siècle).

Fichier Choisel jean-louis-©2005-2013



W.Lauche Deutsche Pomologie, 1882/83.



Stoll 1888 Pomologie.



Heidemij, 1868, De Nederlandsche Boomgaard

**ORIGINE :** Wurtemberg. Décrite par l'allemand Lucas en 1850, par l'allemand Oberdieck 1873, Monats., par le hollandais Heidemij, 1868 De Nederlandische Boomgard pl.15 n°29.

**SYNONYMES :** Weisser Sommer Calvill, Fraas' sommer Calvill, Calville Fraas weisser sommer, Fraas sommer Calville.....

**MATURITE-CONSOMMATION :** Septembre-octobre.

**FORME :** Moyenne. Plus large que haut, conique, côtelée.

**EPIDERME :** Lisse, brillant, onctueux à bonne maturité, jaune à maturité, rarement voilé de rose à l'insolation. Lenticelles fines peu remarquables.

**CUVETTE du PEDONCULE :** Etroite, profonde.

**PEDONCULE :** Moyen à gros, dépasse.

**CUVETTE de L'ŒIL :** Mi large, très côtelée, mi profonde, éventuelle trace fauve.

**L'ŒIL :** Clos, grands sépales laineux.

**CHAIR :** Blanche, fine, tendre, bien juteuse, peu acidulée.

**CRITERE SPECIAL :**

**LOGES :** Hautes, ouvertes, très feutrées.

**OBSERVATIONS :**

**REFERENCES :** Choisel Jean-Louis.

**BIBLIOGRAPHIE :** W.Lauche, Deutsche Pomologie, 1882/83. Rudolf Stoll 1888 Pomologie, Autriche. Heidemij, 1868, De Nederlandsche Boomguard Et voir texte.