


CALVILLE D'ETE



FICHIER étude,photo, coupes =CHOISEL J.L. ©1982-2002

ORIGINE: Trouvée par l'auteur de cette étude Jean-Louis Choisel, , en 1982, à Seloncourt, Doubs, 25230. L'arbre avait alors 97 ans.

SYNONYMES:

MATURITE.CONSOMMATION: Mi-août.Mi-octobre.

FORME: Petite à moyenne. Plus large, un peu discoidale. Pourtour côtelé, un peu asymétrique.

EPIDERME: Lisse, jaune lavé,fouetté d'un beau rouge cramoisi à l'insolation (fouetté non uni). Lenticelles blanches ou gris clair, visibles sur le rouge. Le lavi est variable, de 75 pour cent à moins. **Pas de stries.**

CUVETTE du PEDONCULE: Largeur moyenne, évasée, peu à moyen profonde. Parfois des côtes arrivent.Tachée de gris rayonnant dépassant rarement le sommet.

PEDONCULE: Gros, brun-vert ou brun rouge. Parfois boursoufflé à sa base ou vers le sommet (critère spécial non stable mais signalé dans ma méthode Choisel) Dépasse le sommet de moins un cm., ou ne dépasse pas.

CUVETTE de L'ŒIL: Large ou moyenne, peu à moyen profond. Petites côtes,petites plissures. Pas de gris.

ŒIL: Diamètre 5 mm., pour petits ou gros fruits. Clos ou mi clos.

CHAIR: Blanche,parfois rose sous la peau et dans la chair sous forme de fins filaments après épluchage. Juteuse, sucrée,plus que Calville Rouge d'Été,trouvée à Dampierre-les Bois,Doubs, acidulée,savoureuse. Très bonne à croquer, pour jus,...



LOGES à PEPINS: Hautes, non feutrées, non fendillées. Fermées au centre.

CARACTERES PARTICULIERS: Parfois gibbosités sur le pédoncule.

OBSERVATIONS: Ressemble à Api d'Été décrite par A.Leroy n° 11,1873, mais diffère pour certains critères.

REFERENCES: Jean-Louis Choisel, 1982-2002©.