


CALVILLE DE BOSKOOP

©fichier choisel-2000-2013.

ORIGINE : Pépinières de P.Hooftman , 1863 , à Boskoop.

SYNONYMES : Calville van Boskoop(Heidemij, « De Nederlandsche Boomguard »,1868, pl.22, n°42). Boskoopi Kalvil, Boskoopsky Kalvil,Calvilla di Boskoop.

J. Vercier , en 1934 , p.201 , fait une erreur en décrivant sous ce nom une pomme de couleur jaune(ne pas confondre avec De Revel qui est Transparente jaune ou blanche, mûre mi juillet à début août).



R.Stoll 1888, Autriche, Pomologie..

MATURITE-CONSOMMATION : Décembre-Mars.

FORME : Grosse. Plus large, conique, très côtelé, à peine asymétrique.

EPIDERME : Lisse , jaune lavé de rouge moins foncé côté ombre, striée.

CUVETTE du PEDONCULE : Large, évasée , profonde à moyenne, à peine tachée de gris, ou de vert sombre ; un peu mamelonnée au pourtour .

PEDONCULE : Gros, court, ne dépasse pas du sommet .

CUVETTE de L'ŒIL : Très étroite, peu profonde, côtelée.

ŒIL : Petit, clos ;

CHAIR : Blanchâtre, ou blanc jaunâtre , tendre, fine , très juteuse , acidulée , sucrée, bonne.

Loge dessin choisel.



LOGES à PEPINS : Grandes, feutrées.

OBSERVATIONS : L'arbre est de vigueur moyenne , les rameaux d'été ont des lenticelles allongées , petites .

REFERENCES : (Heidemij, « De Nederlandsche Boomguard »,1868, pl.22, n°42). – Revue Obstgarten 1885.Choisel 2000-2008. Rudolf Stoll Autriche, 1888, Pomologie