


CLAYGATE PEARMAIN

©Fichier choisel 2002-2013



Vue W.Lauche, Deutsche Pomologie, 1882/83



R.Stoll 1888 Pomologie en Autriche.

ORIGINE : Anglaise, 1821.

SYNONYMES : Archerfield Pearmain, Bradley's Pearmain, Brown's pippin, etc...(voir liste synonymes).

MATURITE-CONSOMMATION : Décembre-Février.

FORME : Moyenne. Plus large, un peu conique, pourtour régulier mais avec une surface un peu bosselée.

EPIDERME : Lisse pouvant être un peu rugueux, jaune vert lavé de rouge orange ou brique, un peu marbré de gris un peu squameux, stries rouges peu évidentes. Lenticelles grises éventuellement anguleuses.


CUVETTE du PEDONCULE : Mi large, mi profonde ou plus, plissée, gris squameux.

PEDONCULE : Gros à moyen, court à long, ne dépasse pas ou dépasse.

CUVETTE de L'ŒIL : Large, plissée ou bosselée, grise ou fauve.

L'ŒIL : Large, ouvert.

CHAIR : Blanchâtre à jaunâtre, un peu de vert, ferme, juteuse, sucrée, acidulée, savoureuse.



LOGES à PEPINS : Hautes, lisses, feutrées.

Diel

CARACTERES SPECIAL : Non.

OBSERVATIONS :

REFERENCES : Choisel.

BIBLIOGRAPHIE : W.Lauche 1882/83. Rudolf Stoll, Pomologie en autriche, 1888.