


## COUSINOTTE ROUGE de TOURAINE



FICHIER CHOISEL ©1998(Reproduction soumise à autorisation de Choisel 36, rue Bel Air 37320 Saint Branches).

ORIGINE: C'est peut-être une variante de Cousinotte Rouge d'Hiver (voir cette fiche). Quelques arbres en Touraine. Je suis le premier descripteur .

SYNONYMES: Rosa de Touraine à tort.

MATURITE.CONSUMMATION: Mi octobre.Mars.

FORME: Petite à moyenne. Plus Large ou H=L ou plus Haut, donc assez variable. Conique. Pourtour irrégulier ,asymétrique.

EPIDERME: Plus ou moins rugueux, épais, totalement rouge sombre(pourpre), amplement marbré réticulé de fauve rugueux qui est parfois un peu rougeâtre. Nombreuses petites lenticelles claires (\*) sur la partie rouge plus pâle (côté ombre).

CUVETTE du PEDONCULE: Etroite(\*) ou plus large, moyen-profond ou plus. Irrégulière(un peu mamelonnée), plus ou moins plaquée de fauve un peu rougeâtre.

PEDONCULE: Fin, plus gros à l'attache, incliné, ne dépasse pas du sommet.

CUVETTE de L'ŒIL: Etroite, peu profonde, à pourtour un peu mamelonné(\*).

ŒIL: Petit, clos, à larges sépales.

CHAIR: Blanche(\*), amplement rosée(\*) (Celle d'Hiver et blanc un peu verdâtre et moins rosée, photo du bas), fine, ferme, croquante, sucrée, assez acidulée, très bonne. Petites veines roses sous la peau épluchée.

LOGES à PEPINS: Plus hautes, fendillées-feutrées, un peu verdâtre, peu ouvertes au centre et fermées en coupe équatoriale.

CARACTERES PARTICULIERS:

OBSERVATIONS: Les différences avec Cousinotte Rouge d'Hiver sont repérées (\*).

REFERENCES: Choisel Jean-Louis. (Etude, photos, coupes), photo du bas Cousinotte Rouge d'Hiver.