

# COX ORANGE

© 2000-2007-choisel jean louis.

**ORIGINE :** Angleterre , 1825 , semis de H.Cox , de Ribston Pippin qui donna également la Cox's Pomona. Encore vendue par les pépinières Leroy d'Angers en 1916 et par celles de Pinguet-Guindon de Tours en 1936 sous le nom de Reinette Orange de Cox. On la trouve encore en Touraine et probablement ailleurs. Protégée à Brogdale (the book of apples, 1993 , p.197 et planche 16 , p.90.

Elle à donnée naissance à des clones divers dont Kummeren et Rouge des Flandres, plus rouge, juteux, sucré, très aromatique, mat/cons.10/01, né à Herzelee, Nord.


**SYNONYMES :** Cos Orange(Van Mons, 1858).- Cox Orange Pippin(A.Bivort, Annales de



pomologie Belge et étrangère , 1859 , t.7 , p.11).- Reinette Orange de Cox (d°).- Orange de



Cox (A.Leroy , 1873).-





W.Lauche Deutsche Pomologie, 1882/83

**MATURITE-CONSOMMATION :** Octobre-Janvier.

**FORME :** Petite à moyenne , sphéroïdale un peu conique , plus large , un peu asymétrique , pourtour régulier

**EPIDERME :** Lisse , plus sèche aux endroits marbrés de gris , fond jaune bien lavé et flammé de rouge foncé(1/2 à 3/4) , avec des stries plus foncées et souvent larges. Traces , réticules , marbrures plus ou moins importantes (ne pas confondre avec le russeting) selon les fruits. Lenticelles petites grises ou cendrées peu évidentes.

**CUVETTE du PEDONCULE :** Dimensions petites à moyennes , fauve un peu doré dépassant ou non le sommet , surtout en rayons (franges) et pouvant se disperser vers la surface du fruit en traces , réticules , marbrures comme vu au paragraphe Epiderme.

**PEDONCULE :** Court à long , dépasse ou non. Moyen à gros.

**CUVETTE de L'ŒIL :** Peu à moyen profonde , largeur moyenne , à peine plissée si bien qu'on pourrait la croire unie(régulière). Parfois traces grises ou fauves.

**L'ŒIL :** Petit à moyen , clos ou mi clos aux sépales rabattues à l'extérieur.

**CHAIR :** Blanc jaunâtre à jaunâtre , serrée mais tendre à peau plus dure , bien juteuse , bien sucrée , acidulée sous moyen , flaveur assez remarquable , donc savoureuse.

**LOGES à PEPINS :** Moyennes , closes , feutrées-fendillées bien ou peu selon clone.

**OBSERVATIONS :** Attention à chancre , tavelure , oïdium , en terrains surtout humides. Alternance des fruits et bois peu vigoureux à ne pas greffer au pied.

**REFERENCES :** Choisel jean-louis , étude , photos.©2000- Heidemij "De Nederlandsche Boomguard", 1868, n°110, pl.56.- A.Leroy Angers, 1873, Dictionnaire de Pomologie , n°309.

**BIBLIOGRAPHIE :** H.Kessler , 1949 , Suisse , Pomologie Illustrée , p.25. - 100 variétés de fruits, 1983 , Suisse, p.52/53 , Station fédérale de recherche agronomique de Changins.

