



COX'S POMONA Jaune.

©fichier choisel 2000-2013



A.Beefink.



ORIGINE : Anglaise, semis obtenu avant 1865, à Colnbrooklaxn, près de Colnbrook, entre Windsor et Londres par H.Cox.(d'après Von Bose,1867, p.67, pomologue allemand et acquiescé par Ch. Downing « Fruits and fruit trees of America », 1869, p.135. C'est le Dean's Codlin vendu par les pépinières Jamin et Durand à Bourg-la- Reine qui l'offrirent en 1865 à Leroy et que cite encore vers 1934, p336 « Traité d'arboriculture fruitière...), Alfred Nomblot, pépiniériste à Bourg-la-Reine.Vendue encore en 1916 et 1935 aux pépinières Leroy d'Angers et par celles de Pinguet-Guindon à Tours en 1936(qui ne décrit pas la couleur). Dans « Annales de pomologie belge et étrangère »voir réédition de 1998, p.677, A.Bivort nous apprend que Cox's Pomona bien différente de Cox's Orange est née avec elle lors de semis de neuf pépins de Ribston Pippin et gagnée en 1830 par R.Cox de Colnbrook-Lawn à Backs.

Il existe une autre Cox's Pomona décrite par le Hollandais Heidemij, n°64, 1868, « De Nederlandsche Boomguard » et par « the Book of Apples »1993, p198, conservée à Brogdale, mais celle-ci est presque toute rouge et bien striée de même et serait obtenue d'un semis de Ribston Pippin par Richard Cox vers 1825 à Colnbrook Lawn, Angleterre. W.Lauche, en 1882/83, n°59 « Deutsche Pomologie » représente lui aussi un fruit conique, côtelé très rouge. Quelle confusion avec Leroy et Jamin et Nomblot qui, eux, parlent d'un fruit tout jaune(description ici) ! et voir fiche Cox Pomona.

SYNONYMES : Dean's Codlin(Jamin et Durand « Catalogue descriptif d'arbres fruitiers... », 1869, p.133.- Deans Küchen Apfel (Nicolas Gaucher , Allemagne , 1894 , Pomologie de l'Arboriculteur. Orange reinette van pomona(R.Lijsten,Nederlandshe fruitsoorten).

MATURITE-CONSOMMATION : Octobre-Décembre et plus en Allemagne.

FORME : Plus que moyenne, L=68mm., H=68mm.- Plus large ou H+L, conique.

EPIDERME : Mince, unie, jaune clair verdâtre passant au jaune brillant côté insolation ; ça et là petites taches noirâtres ou fauves ou un peu rouges. Lenticelles brunes.

CUVETTE DU PEDONCULE : Faible mi profonde ou peu.

PEDONCULE : Très charnu, très court, ne dépasse pas du sommet.

CUVETTE DE L'ŒIL : Faible, plissée, peut être fauve.

ŒIL : Grand ou moyen , clos ou mi clos.

CHAIR : Blanchâtre, mi fine, très tendre, bien juteuse, acidulée, peu sucrée, goût un peu herbacé. Deuxième qualité. Cuisson.

LOGES à PEPINS :

CARACTERES PARTICULIERS : pédoncule très charnu et très court.

OBSERVATIONS : Arbre de très faible vigueur à rameaux ayant de nombreuses et grandes lenticelles. Yeux moyens, écartés de l'écorce, peu cotonneux. Feuilles très petites à grêle et court pétiole.

REFERENCES : A.Leroy, Angers, 1873 « Dictionnaire de Pomologie », n°129.(silhouette ici). Nederlandshe Fruitsoorten, A.Beefink pour la vues, 1942.Choisel jean-louis recherches.