


De CANNELLE

©choisel jean louis-2000-2007.

ORIGINE : Hollandaise. Signalée en 1760 par le hollandais Herman Knoop. A.Leroy d'Angers l'a reçue d'Allemagne en 1869.(silhouette ici). Et voir Diel, Lucas, Oberdieck



(Illist.1855, Allemagne).

SYNONYMES : Zimmet (Herman Knoop, « Pomologie », édition allemande, 1760, t.II, pl.XI, n°84.).- Cannelle d'Eté (Mas « Le Verger », 1868, t.V, pommes précoces, n°21.).- Cannelle Rayée d'Eté(d°).- Petit Pigeonnet(d°).- Pigeonnet(d°).- Pigeon Rouge d'Automne(d°).- Rothe Herbst Taubenapfel(d°).

MATURITE-CONSOMMATION : Courant septembre- Décembre.

FORME : Sous moyenne, L=56mm., H=54mm.- Plus large, conique, un peu asymétrique.

EPIDERME : Jaune terne, très amplement marbré et strié de rouge lie de vin. Lenticelles grises, peu visible, ça et là.

CUVETTE du PEDONCULE : Large, profonde.

PEDONCULE : Gros, long, dépasse du sommet ;

CUVETTE de L'ŒIL : Largeur moyenne, peu profonde. Unie.

ŒIL : Grand, mi clos, longs sépales ;

CHAIR : Blanchâtre, fine, mi tendre, juteuse, très sucrée, saveur aromatique semblable à la cannelle. Première qualité.



LOGES A PEPINS : Closes, lisses

Diel.

OBSERVATIONS : Arbre vigoureux. Rameaux aux lenticelles nombreuses et grandes. Yeux moyens, duveteux, en partie collés à l'écorce. Feuilles petites régulièrement dentelées. Pétiole moyen.

REFERENCES : André Leroy, Angers, « Dictionnaire de Pomologie », 1873, n°97. .