

DE CANTERBURY

FICHER CHOISEL©2001-2002-2008.



D'après C.A.Hennau, 1853, collection privée.

Mas, 1868, Le Verger, n°52.

ORIGINE : Anglaise. Introduite en France en 1838 , et plus tard, chez A.Leroy d'Angers. Selon Leroy et Hennau (Annales de pomologie...), son synonyme de Reinette n'est pas mérité. C'est plutôt un type Calvillé.

SYNONYMES : Reinette de Cantorbery (F.Hérincq, "Revue horticole", de Paris, 1848, t.II,p.26).- De Cantorbury (J.L. Jamin, "Note sur l'arboriculture fruitière", insérée dans les "Annales de la Sté d'Horticulture de Paris", 1852, p.316).- De Cantorbery (C.A.Hennau, "Annales de pomologie belge et étrangère", 1853, t.1, p.109; et réédition 1998, pp.151/152).- Reinette de Canterbury (Jahn, "Illustriertes Handbuch der Obstkunde", 1862, t.IV, p.129, n°327).- Melon (Congrès pomologique, "Pomologie de la France", 1867,t.IV, n°33).
Canterbury.

MATURITE-CONSOMMATION : Novembre-Février(Leroy et Vercier), Janvier-Mars(Hennau),

FORME : Volumineuse, L=88mm., H=70mm.- Plus large, Sphéroïdale, aplatie aux pôles, bien pentagone côté cuvette de l'oeil. D'après Jahn avant 1865 voir forme du pédoncule dans le paragraphe Loges.

EPIDERME : Lisse, mince, brillante, jaune à reflets légèrement verdâtres (Leroy), verte et d'une légère teinte jaune à maturité(Hennau), jaune foncé ou jaune verdâtre(Vercier). Quelques lenticelles peu visibles, grises (blanches=Hennau).

CUVETTE du PEDONCULE : Vaste, profonde(Leroy), étroite, profonde(Hennau), étroite(Vercier), fauve.Spéciale voir Jahn Loges.


PEDONCULE : Long, grêle au milieu, renflé à ses extrêmes, dépasse. Et voir Jahn, Loges.

CUVETTE de L'ŒIL : Large (24mm.), peu profonde, cernée de petites côtes(Hennau), de côtes(Vercier). La vue couleur de Mas montre une cuvette tachée de fauve.

ŒIL : Moyen ou petit, clos ou mi clos , à longs sépales, (cotonneux=Hennau).

CHAIR : Blanche, tendre, mi fine, assez croquante, très juteuse, sucrée mais douceâtre et presque sans parfum , deuxième qualité(Leroy).-Blanche, spongieuse, granulée, juteuse, de bon goût mais un peu trop acidulée (Hennau).

LOGES à PEPINS : Grandes, ouvertes (Hennau) et bien feutrées ou



fendillées.
Oberdieck.

Jahn, 1865, n°327, Allemagne, Illustrirte de Lucas et

OBSERVATIONS : Arbre vigoureux (Leroy, Vercier), moyen vigoureux (Hennau), à rameaux étalés, très gros, bien cotonneux, (Leroy, Vercier), grêles(Hennau), à lenticelles petites et clairsemées(Leroy, Vercier). Yeux Gros, duveteux, collés à l'écorce(Leroy, Vercier). Feuilles 2paise, coriaces, ovales, moyennes, à gros pétiole court et peu cannelé. Très fertile.

REFERENCES :Choisel, recherches.

BIBLIOGRAPHIE : J.Vercier, 1934, p.231.- Annales de pomologie belge et étrangère déjà cité, épiderme vert. A.Leroy, Angers,1873 "Dictionnaire de Pomologie", n°98, silhouette ici.- Mas, "Le Verger", t.4, 1868, n°52.- Jahn voir à Loges.