


DE CHESTER

©1994 2012 Fichier choisel.



silhouette A.LEROY 1873 coloriée choisel

ORIGINE : Anglaise, fin du 18^e siècle. Déjà connue, en 1801, en Allemagne. Propagée en Europe et en Amérique par les pépinières Leroy d'Angers .

SYNONYMES : Englische Chester reinette.

Ne pas confondre avec Chester Red Streak, ni avec Chester Spitzenbergh des USA.

MATURITE-CONSOMMATION : Novembre-Février.

FORME : Sous moyenne ou plus grosse. Plus large, sphéroïdale, très aplatie aux pôles.

EPIDERME : Un peu rugueux, jaune ou jaune verdâtre, nuancé de rouge-brun terne côté insolation. Lenticelles, grosses, nombreuses, fauves.

CUVETTE du PEDONCULE : Peu large, assez profonde.

PEDONCULE : Très gros, court, charnu.

CUVETTE de L'ŒIL : Petite, unie.

L'ŒIL : Grand à moyen, clos.

CHAIR : Jaunâtre, mi fine, tendre, bien juteuse, très sucrée, peu acidulée, presque sans saveur, 2^e qualité.

OBSERVATIONS : Lenticelles sur rameaux nombreuses, de grandeur variable.

REFERENCES : choisel

BIBLIOGRAPHIE: A.Leroy, Angers, 1873, Dictionnaire de pomologie, n°110 et silhouette.

