

Guide des pommes choisel ©

## DE JAUNE

(FICHIER CHOISEL J.L.)©1987-2002-2010



Photo, Choisel 1981.

**ORIGINE:** Avant 1805. Son origine n'a pas été vraiment définie. Admise pour la première fois en 1867 par le congrès pomologique sous le nom : DE JAUNE. Les vieux arboriculteurs de Saint-Aubin le Dépain, Indre-et-Loire, affirment que cette variété est issue de leur village. André Leroy, pépiniériste à Angers, au 19<sup>e</sup>. siècle, écrit que, depuis deux siècles, De Jaune existe dans le canton de Montfort (Sarthe), et que le général anglais Hawles en cultivait au château de la Rochefuret près Tours., vers 1805. En Indre-et-Loire cette variété fut la plus cultivée en 1926 à raison de trois milles tonnes se répartissant ainsi : Azay-le-Rideau=1000 tonnes, Château-la-Vallière=400 tonnes, Langeais=200 tonnes, Neuillé-Pont-Pierre=200 tonnes, Saint-Paterne=500 tonnes, Environs de Tours=400 tonnes, Autres=300 tonnes. En 1936 à Saint Paterne (Indre et Loire) le pommier de monsieur Perdriau produisit 1680 kg. En 1938, M. Boussin, maire de Beaumont Pied Bœuf, près de Château du Loir (Sarthe), demanda officiellement et fut exaucé, que cette variété soit nommée "Reinette du Mans".


J'ai été chargé, bénévolement, en 1992, pour les Croqueurs de Touraine et pour l'AFCEV, d'étudier et d'établir une fiche complète pour laquelle j'ai prêté mon fichier et je me suis déplacé dans divers vergers. J'ai transmis ce dossier complet à qui de droit, le 09/05/1993. Plus tard je fut chargé de remplir un dossier pour l'INRA

**SYNONYMES:** D'Argent (Indre et Loire), (Liron d'Airolles, Annales de pomologie belge et étrangère, 1860, t.8, pages 45,46 et page 805 de la réédition de septembre 1998 chez Naturalia à Turriers 04250.).- De Jaune (de la Sarthe) (idem et Pépinières belges de la société Van Mons, catalogue général, 1863, t.1, p.386).- Breton (Sté.d'Horticulture de Paris, Cahiers de

dégustations, 1861). - De Fer (idem). - Pape. - De Pépin. - Pomme de deux ans, Reine de Mai, Pépin de Reinette (catalogue Pinguet-Guindon, Tours, 1936).

De Jaune est confondue, à tort, probablement, avec Francatu et elle a donnée naissance à d'autres semis cultivés dont Jaune-Beurre (voir cette fiche) moins sensible à la tavelure à chair plus jaune, épiderme rude et plus jaune foncé (l'Evêque, 1946). La Reinette du Mans X2738T est indemne de viroses.

Ne pas confondre avec Reinette de Savoie, Reinette de Champagne (coupez ici), Reinette de Pluvigner, Reinette Blanche de Châtellerault, Clairette des Deux-Sèvres, De Jeu, ...



MATURITE. CONSOMMATION: Décembre. Août et plus, en bonne cave.

**FORME:** Grosseur moyenne et plus environ 200g.. Il existe deux types de fruits sur le même arbre. Une qui est sphéroidale, plus large, non cônique. L'autre est sphéroidale cônique, plus large. Pourtour régulier.

**EPIDERME:** Un peu rugueux, ou lisse selon les lenticelles. Jaune plus foncé à l'insolation. Nombreuses lenticelles gris roux à gris cendré, anguleuses mais petites.

**CUVETTE du PEDONCULE:** Largeur moyenne, profonde, fauve roux à peine présent ou plus.


**PEDONCULE:** Gros à moyen, court ou dépassant rarement de moins un cm. du sommet. Renflé à l'attache.

**CUVETTE de L'ŒIL:** Peu profonde à moyenne, large à petite, surtout pour le type cônique. Parfois unie, surtout plissée ou mamelonnée. Parfois traces rouille.

**ŒIL:** Petit à moyen, clos ou mi clos.

**CHAIR:** Blanche non éclatante à blanc-jaunâtre, ferme, mi fine à fine, juteuse, sucrée moyennement, légère saveur vanillée, peu acidulée. Extra pour les tartes Tatin.

**LOGES à PEPINS:** Lisses, parfois un peu fendillées et même, un peu feutrées. Assez larges en demi-lune à peine ouvertes à maturité. Rapport  $H/L=1,5/1,2=1,2$ .



choisel.



**CARACTERES PARTICULIERS:**

**OBSERVATIONS:** Récolte 4 semaines après Golden D. Conservation 200 jours à plus 2°C.

Port mi étalé devenant plus tard en dôme. Très fertile. En terrains humides attention au chancre 'Nectria Galligena ». Calibre du fruit assez régulier. Pollinisé par Cravert, Faros, Pépin de Bourgueil.

FLORAISON : Très tardive, 3 à 4 jours après Pépin de Bourgueil. Fleurs rosées à pétales disjoints, arrondis ou ovales.

REFERENCES: Choisel Jean-Louis, GUIDE des POMMES, p.64, Editions Hervas, 1991, 1996, Paris(gouache couleur Ph. Voisard).- Choisel J.L., Petite Histoire des Fruits de Touraine, 1987, p.39,©.- Premier Congrès de la pomme de table des 26-27 juin 1926 à Bourges p.63-64.- Dictionnaire de Pomologie, A.Leroy, 1873, Angers, n°234.- Catalogue des pépinières Leroy, 1916.-

