


DE MEUNIER

Fichier choisel 1994-2012



silhouette A.LEROY 1873 coloriée choisel

ORIGINE : Arrondissement de Beaupreau, Maine-et-Loire ("Description des fleurs et des fruits nés dans le département de Maine-et-Loire", 1835, Millet, p.116). Cultivée par André Leroy d'Angers avant 1873.

SYNONYMES :

MATURITE-CONSOMMATION : Février-Avril.

FORME : Moyenne, L=67mm., H=57mm.- Plus large, sphéroïdale, sensiblement aplatie aux pôles.

EPIDERME : Mince, lisse, vert clair nuancé de jaune côté ombre et vert brunâtre à l'insolation. Abondantes lenticelles marron foncé.

CUVETTE du PEDONCULE : Large, peu profonde, fauve.

PEDONCULE : Gros, et renflé à l'attache, droit ou arqué, assez court mais dépasse un peu le sommet puisque la cuvette est peu profonde.

CUVETTE de L'ŒIL : Très large (27mm.), très profonde, unie.

ŒIL : Moyen, ouvert ou mi clos.

CHAIR : Blanc verdâtre, mi fine, mi tendre, bien juteuse, sucrée, faiblement acidulée, sans parfum. Deuxième qualité.

OBSERVATIONS : Arbre très vigoureux aux rameaux étalés, gros, très cotonneux à nombreuses et grandes lenticelles. Yeux moyens, duveteux, tout collés à l'écorce. Feuilles

grandes, épaisses, irrégulièrement et très largement dentelées à gros pétiole flasque et de longueur moyenne, à cannelure prononcée. Fertilité normale.

REFERENCES : choisel

BIBLIOGRAPHIE : A.Leroy, Angers, 1873, "Dictionnaire de Pomologie", n°273, silhouette ici.