


DEAN'S CRAB (Eté.Automne).J.

Fichier choisel 1990-2012



silhouette A.LEROY 1873 coloriée choisel

ORIGINE: Nouveauté, en 1858, dans le catalogue , page7, du pépiniériste Berckmans à Augusta, Amérique. Il envoya cette variété à André Leroy d'Angers, en 1862.

SYNONYMES: Pomme sauvage de Dean. Ne pas confondre avec Dean's Sweeting(pomme Douce de Dean), signalée de l'Indiana par John Warder(American Pomologie, 1867, p.716).

MATURITE.CONSUMMATION: Septembre.Novembre.

FORME: Moyen à plus, L=67mm., H=63mm.- Cylindro-conique, plus large, très côtelée au sommet.

EPIDERME: Unie, jaune d'or, un peu strié de rose tendre côté insolation. Fortement ponctué de brun.

CUVETTE du PEDONCULE: Large, en entonnoir, tachée de roux squameux.

PEDONCULE: Grosseur moyenne, court ou moyen, ne dépasse pas du sommet.

CUVETTE de L'ŒIL: Peu profonde, très côtelée, pas de grande largeur.

ŒIL :Grand ou moyen, ouvert ou mi clos.

CHAIR: Blanchâtre, tendre , fine, peu compacte, juteuse, bien acidulée, sucrée, sans saveur particulière. Deuxième qualité.

CARACTERES PARTICULIERS: Très côtelée côté œil.

OBSERVATIONS: Arbre assez vigoureux. Rameaux à lenticelles grandes, brunes, nombreuses. Yeux un peu écartés de l'écorce. Feuilles très lisses, faiblement dentelées.

REFERENCES: choisel

BIBLIOGRAPHIE : A.Leroy, Dictionnaire de Pomologie, 1873, t.3, n°136.(silhouette ici)