




DOUBLE BON POMMIER

©Fichier Choisel jean-louis-1994-2007.

ORIGINE : Cultivé depuis longtemps dans le Nord. Serait à l'origine des mutants mûrissants à des périodes différentes : Belle Fleur Obin, Double Belle Fleur Rouge de l'Indre, Belle Joséphine de la Brie. On le trouve encore en Haute-Marne.

Photos et coupe Choisel Jean-Louis ©

SYNONYMES : Belle Fleur Double, Double Bon Ente, Double Conente .





merci à l'ami Grojean

MATURITE-CONSOMMATION : Octobre/novembre-Février.

FORME : Grosse , variable. Plus large, sphéroïdale ou conique, asymétrique pour certains fruits , pourtour irrégulier légèrement côtelé.

EPIDERME : On pense un peu à Rambour Papeleu. Lisse, jaune clair devenant doré à l'insolation , frappé par endroits de rouge vif et petites stries rouge plus foncées. Lenticelles grises. Traces fauves possibles surtout vers la cuvette de l'œil.

CUVETTE du PEDONCULE : Evasée, mi à assez profonde, fauve peu débordant.

PEDONCULE : Gros, court, ne dépasse pas.

CUVETTE de L'ŒIL : Etroite à moyenne, profonde ou mi profonde, plissée, côtelée, fauve débordant irrégulièrement.

L'ŒIL : Grand, ouvert ou mi clos.

CHAIR : Blanc-jaunâtre , un peu de vert en filaments , tendre , juteuse , sucrée , acidulée. Pour table et jus.

LOGES à PEPINS : Petites à plus grandes, closes à ouvertes à bonne maturité.

CARACTERES SPECIAL : non.

OBSERVATIONS : Floraison tardive.

REFERENCES : Choisel j.l.©1994 photos, coupes, pastel, description.

BIBLIOGRAPHIE : Catalogue de la Sté Pomologique de France, 1927, p.540 - Le Verger Français, 1948, p.242 - J.Vercier, 1934, p.286.

Photos de mon ami Jean-Claude Grandjean Haute-Marne



2007 :