



DOWNTON (01.03)-J-

Fichier Choisel Jean-Louis 2000-2008.

ORIGINE : Obtenue de semis d'un croisement d'Orange Pippin par Golden Pippin, vers 1806, par l'anglais Thomas-André Knight, dans le comté d'Hereford, à Wormsley-Grange. Cultivée plus tard par les Allemands, les Belges, puis par A.Leroy à Angers.

Une variété de ce nom est conservée à Brogdale (the Book of Apples", 1993, p.202) mais la conservation (Septembre-Novembre) est plus courte que celle indiquée par Leroy.

SYNONYMES : Downton Pippin (Van Mons "Catalogue de ses fruits cultivés de 1798 à 1823, p.37, n°533) 6 Elton Pippin (George Lindley "Guide to the orchard and kitchen garden", 1831, p.28)- Knight's Pippin (d°)- Elton Golden Pippin (Tompson "Catalogue...the hoticultural Sté à Londres", 1842, p.13, n°217)- Knight's Golden Pippin (d°)- Saint-Mary's Pippin (d°)- Downton Golden Pippin (A.J.Downing, "the Fruits and fruit trees of America", 1849, p.82)- Downton Nonpareille (d'Albret, "Cours théoriques et pratiques de la taille des arbres fruitiers", 1854, p.332)-

Ne pas confondre avec Pepin Knight obtenue par le belge Van Mons vers 1800, (n°490, p.36 de son catalogue, alors qu'on y trouve notre Knight's Pippin sous le n°533, p.37).

MATURITE-CONSOMMATION : Janvier-Mars.

FORME : Sous moyen, L=60mm., H=60mm.- Plus large ou H=L ou plus haut. Cylindro-conique (Leroy), cylindrique (gravure couleurs de Mas).

EPIDERME : Unicolore, faiblement rugueux, jaune citron plus foncé à l'insolation, un peu réticulé de brun. Nombreuses lenticelles gris-roux. (peut-être anguleuses?).

CUVETTE du PEDONCULE : Peu prononcée.

PEDONCULE : Gros, très court, renflé à l'attache. Ne dépasse pas chez Leroy, dépasse chez Mas.

CUVETTE de L'ŒIL : Presque à fleur de fruit, plissée, rousse.

ŒIL : Grand, mi clos.

CHAIR : Jaunâtre, fine, compacte, juteuse, sucrée, savoureusement acidulée et parfumée. Première qualité.



LOGES à PEPINS : Closes, lisses

Diel.

CRITERE SPECIAL:

OBSERVATIONS : Arbre de moyenne vigueur à rameaux cotonneux. Yeux petits, plats, duveteux, fortement collés contre l'écorce. Feuilles moyennes, finement dentelées à court et grêle pétiole rigide. Fertilité normale.

REFERENCES :A.Leroy, Angers, 1873, "Dictionnaire de Pomologie", n°144.(silhouette ici). Gravure couleurs(collection AR) de M.Mas, "Le Verger", 1868, t.4n°64.