


# FENOUILLET JAUNE

©2000-2008-choisel jean louis.

**ORIGINE :** Maine-et-Loire avant 1628, d'après A.Leroy. Encore vendue en 1935 chez Leroy à Angers. Décrite par Hennau dans "Annales de pomologie belge et étrangère", t3, n°78 et réédition de 1998, p.354. Gorge de Pigeon donné par Knoop se rapporte à Fenouillet Gris.

**SYNONYMES :** Fenouillet Blanc(Le Lectier, Orléans, 1628, p.23)- et Merlet, "l'Abrégé des bons fruits, 1667, p.152)- Court-Pendu Blanc(dom Claude Saint-Etienne, 1670, p.209;- et Manger, "Systematische Pomologie, 1780, 1ere partie, p.46, n°LXXIX)- Fenouillet Drap D'Or(Duhamel,1768, t.1, p.290)- Court-Pendu Jaune(Mayer, "Pomona franconica", 1776-



1801,t.3, p.155)-Faux Drap D'Or(d°)- De Caractères(de Launay, "le Bon Jardinier", 1808, p.140)- D'Anis Hative(Congrès pomologique, Pomologie de la France, 1867, t.6, p.54)- Fenouillet Doré(d°)- Embroidered pippin(Lindley)-Goldartiger Fenchelapfel(allemagne). A signaler que les synonymes de Court-Pendu sont un nom sens car ceux-ci sont acidulés et non doux . Les Fenouilllets sont doux.

**MATURITE-CONSOMMATION :** Décembre-Mars.



Photos Choisel Jean-Louis 2002©



**FORME :** Sous moyenne, L=61mm., H=50mm.- Plus large, sphéroïdale-comprimée. Asymétrique.

**EPIDERME :** Rugueuse, épaisse, verruqueuse, jaune grisâtre ou blanchâtre, en partie couverte d'une couche roussâtre très transparente, sous laquelle apparaissent de nombreux réseaux et lignes dorés, entremêlés de larges points gris foncés(Annales=un peu frappé de rouge côté soleil).

CUVETTE du PEDONCULE : Etroite, peu profonde.

PEDONCULE : Assez gros, surtout à l'attache, assez court dépasse ou non du sommet.

CUVETTE de L'ŒIL : Rarement bien prononcée, quelques gibbosités ou petits plis. Parfois elle paraît unie;

ŒIL : Grand, ouvert, parfois mal formé, courts sépales.

CHAIR : Très Blanche (Annales= Blanc lacté), prend vite à l'air une teinte roux verdâtre, odorante, fine, assez tendre, croquante, peu juteuse, très sucrée, DOUCE, saveur de fenouil. Première qualité.

LOGES à PEPINS : Moyennes, lisses ou un peu feutrées, mi ouvertes à ouvertes vers mi février;

OBSERVATIONS : Arbre de moyenne vigueur à rameaux érigés, peu duveteux, à lenticelles petites, fines, clairsemées, peu visibles. Yeux moyens à petits, très plats, noyés dans l'écorce. Feuilles moyennes, fortement dentelées, à gros et long pétiole rouge foncé sans cannelure.

REFERENCES : André Leroy, Angers, 1873, "Dictionnaire de Pomologie", n°159(silhouette en haut).Choisel Jean Louis étude sur fruits et deux photos prises dans le Lochois ©2000-2002.