



FLEINER DU ROI

© choisel jean louis-2001-2013



ORIGINE : Wurtemberg, cultivé à Hegnach près de Waiblinge. Décrit la première fois en 1848, dans le « Hohenh. Wochenblat. ». A.Leroy d'Angers l'a reçu du docteur Karl Koch, professeur de botanique à l'Université de Berlin, en 1868. J'en ai trouvé dans un verger de Touraine.





vue Oberdieck et Lucas 1867 Monatshefte.

SYNONYMES : Königs-Fleiner (Edouard Lucas, directeur de l'Institut pomologique de Reutlingen, Wurtemberg, « Illustriertes Handbuch der Obstkunde, 1859, t.1, p.181, n°75.). Confondue à tort avec Grelot, en Dordogne.

MATURITE-CONSOMMATION : Leroy) : Octobre-Novembre. Vercier) : Décembre-Février.

FORME : Très gros, L=85mm., H=88mm.-Plus haute à plus large, conique, asymétrique,



pourtour irrégulier.

EPIDERME : Mince, lisse, jaune clair verdâtre ou citrin, voilé de rose tendre à l'insolation. Lenticelles fauves et blanches peu évidentes.



Photo ©2010 CHOISEL Jean-Louis, plus certain.

CUVETTE du PEDONCULE : Large, très profonde (étroite=Vercier)(moyenne à étroite = choisel), brun olivâtre.

PEDONCULE : Gros, court, oblique, ne dépasse pas du sommet.

CUVETTE de L'ŒIL : Très large(32mm.ou plus), très évasée, bien profonde, plissée, bosselée ou très côtelée.

ŒIL : Grand, très ouvert, ou mi clos, cotonneux.

CHAIR : Très blanche(Vercier=blanchâtre)(choisel = blanche), mi fine, tendre et peu serrée, juteuse, assez sucrée, acidulée, agréable bien que sans parfum.

LOGES à PEPINS : Moyennes à petites, closes, feutrées-fendillées ou bien feutrées (choisel).

OBSERVATIONS : Arbre peu vigoureux, à rameaux grêles, aux lenticelles nombreuses, petites ou moyennes. Yeux petits, arrondis, cotonneux, collés sur l'écorce. Feuilles régulièrement dentelées. Pétiole grêle, court.

REFERENCES : choisel jean-louis.

BIBLIOGRAPHIE : A .Leroy, Dictionnaire de Pomologie, 1873, t.3, n°169.- J.Vercier, 1934, p.296. Choisel jean_louis : photos , étude.©2001-2010(photo 2010 plus probable). Oberdieck et Lucas Monat. 1867.