

# FLEURITARD.

Fichier Choisel jean-louis-©2007



Auteur vues : Choisel Jean-Louis 2007©

**ORIGINE :** Des confusions avec des variétés pas faciles de distinguer les uns des autres. Nous avons FLEURITARD ou TARD FLEURI de Lorraine assimilée avec FRANC BON POMMIER ou BON POMMIER de Lorraine, FLEURITARD ROUGE trouvé en Seine-et-Marne. Toutes sont lavées de rouge et ont, à peu près, les mêmes critères dont le pastel et les descriptions ci en bas résument l'aspect général. Voir les autres fiches.....

## **SYNONYMES :**

**MATURITE-CONSUMMATION :** Décembre-mars/avril.

**FORME :** Moyenne. Plus large, sphéroïdale, pourtour plus ou moins régulier, parfois un peu d'asymétrie.

**EPIDERME :** Lisse, jaune verdâtre passant au jaune, lavé d'un rouge plus ou moins foncé, parfois sombre ou violacé. Quelques stries plus foncées. Le type FLEURITARD ROUGE trouvé dans la Brie semble plus foncé, plus violacé.

**CUVETTE du PEDONCULE :** Pas très vaste, fauve.

**PEDONCULE :** Gros, court, ne dépasse pas.

**CUVETTE de L'ŒIL :** Moyenne, côtelée ou plissée

**L'ŒIL :** Moyen, clos ou mi clos.

**CHAIR :** Blanchâtre à blanc verdâtre, ferme, sucrée, mi acidulée à normalement acidulée.

## **CRITERE SPECIAL :**

**LOGES :** Closes, lisses ou un peu feutrées.

## **OBSERVATIONS :**

**REFERENCES :** 2007.Choisel Jean-Louis

## **BIBLIOGRAPHIE :**

