


# FRAMBOISE D'OBERLAND

©choisel jean-louis. 1978-2007.

FICHER CHOISEL Jean-Louis.©2002-2007

ORIGINE : L'Oberland Bernois se situe dans les Alpes suisses, pourtant, cette pomme appelée, à l'origine, Framboise, est selon Leroy, originaire de Hollande ou elle fut décrite pour la première fois par Herman Knoop en 1740, puis 1771(Leroy semble confondre avec FRAMBOISE(2) ou Calville rayée d'automne). Très cultivée en Allemagne, autrefois. Leroy d'Angers l'a reçue du Wurtemberg vers 1868. Appelée Framboise par Leroy et framboise d'Oberland par Sickler, premier descripteur allemand, dans « Teutscher obstgärtner », 1804, t.22, p.101.



choisel©

SYNONYMES : Calville d'Automne rayé(Herman Knoop « Pomologie », 1771,p.16 et 1740,p.5)- Gefreeppte Herfst Calville(d°)- Framboos Appel Winter(d°),( ici, gravure pl.2 de 1740).- Oberlander Himbeer(Lucas « Kernobstsorten Württembergs », 1854, p.24). Ne pas confondre avec autres Framboise et Calvilles Rouges malgré ces synonymes.



choisel ©

**MATURITE-CONSOMMATION** : Octobre-Janvier, d'après Leroy-(Mûrit en octobre, d'après Knoop et octobre-décembre pour Lauche). Celle que j'ai retrouvée en 1980 (à Joncherey-90-chez un vieux greffeur suisse) et que j'ai aussitôt regreffée (ma première production en 1982 voir mes photos ici), mûrit de courant septembre à novembre à mon ancien domicile de Fontenelle (Franche-Comté), et à partir de fin juillet 1994 à Saint Branches (Touraine). Courant septembre c'est l'époque donnée par A. Royer pour POMME FRAMBOISE et Morren pour FRAMBOISE (et pas d'Oberland), dans « Annales de Pomologie belge et étrangère », voir p.158 et pl.p.160 de la réédition 1998 et la Belgique horticole, 1856 (Morren).

**FORME** : Plus que moyen, L=75mm, H=65mm.-Souvent conique, plus large, parfois H=L, pourtour irrégulier, côtelée côté cuvette œil.

**EPIDERME** : Lisse, jaune verdâtre devenant plus jaune à maturité, lavé de carmin plus ou moins foncé, bien foncé côté insolation (1/2, 1/1, 2/3, ...). Strié d'un rouge plus foncé dans le lavi. Nombreuses petites lenticelles gris-blanc dans le rouge et roses sur le jaune. Quelques traces fauves, parfois anguleuses.

**CUVETTE du PEDONCULE** : Large profonde, parfois étroite et peu profonde, gris fauve argenté rayonnant ne dépassant pas du sommet. Côtelée (Annales de pomologie...).

**PEDONCULE** :, longueur=2cm, gros, vert un peu charnu (Annales de pomologie...), gros et court (Leroy), longueur variable et grosseur moyenne, dépasse le sommet de moins un cm. (choisel)

**CUVETTE de L'ŒIL** : Peu à assez profonde, évasée, large, plissée, côtelée. Peu développée et côtelée (Leroy). Peu profonde et côtelée (Annales de pomologie...). Pas de gris.

**ŒIL** : Petit à moyen, clos.

**CHAIR** : Blanche un peu verdâtre, un peu veinée de vert (Très blanche=Leroy), (Blanche=Annales), tendre, (bien moëlleuse=choisel), (bien moëlleuse=choisel), sucrée, à peine acidulée, (acidulée=choisel), juteuse, parfum de framboise. Première qualité pour amateurs de pommes douces (Leroy). Peau ferme par rapport à la chair (choisel) ;

LOGES à PEPINS : Grandes, ouvertes(Annales...).Pas ou peu feutrées, ouvertes ou



non(Choisel).

OBSERVATIONS : Il semble que la variété retrouvée à Joncherey 90, soit un clone différent de celle décrite par Leroy.(maturité, chair,...).



Arbre très vigoureux, à rameaux ayant de grandes lenticelles clairsemées(Leroy), nombreuse et petites(Annales). Yeux moyens peu écartés de l'écorce. Feuilles grandes (petites= Annale...), profondément dentelées à long et gros pétiole.

REFERENCES : A.Leroy, Angers, « Dictionnaire de Pomologie », 1873, n°171.et le Catalogue de ses pépinières en 1916.- Choisel, étude, photos, coupes ©1978-2002-2007.

BIBLIOGRAPHIE : voir plus haut.