


# GOLDEN DELICIOUS.

Fichier Choisel jean-louis-©2005



Photos Jean-Louis Choisel © 2005

**ORIGINE :** Avant l'arrivée des premiers colons européens en Amérique et au Canada il n'y avait pas de pommiers domestiques sur ces terres. Les colons y introduisirent des variétés par semis ou par plantation de jeunes sujets . Nous pouvons donc assurer que l'Amérique et le Canada possèdent des pommiers qui ont pour ancêtres des sujets venus de France(Normandie, Poitou, Bretagne, Franche-Comté, etc...), du Pays de Montbéliard(alors indépendant de la France), de Suisse, d'Allemagne, etc.....

Avec les années, des pépins semés par hasard ou volontairement, donnèrent automatiquement de nouvelles variétés sur les sols américains et Canadiens(exemple : Red Délicious serait issue, en Iowa, d'un semis de Belle Fleur, en 1870). C'est ainsi que vers 1890 Golden Délicious fut découverte en Virginie (USA). Elle fut apportée par le fermier A.H.Mullins et mise, vers 1914, à la connaissance des frères Stark habitant la Louisiane, qui

la mirent dans le commerce en 1919. Donc en 1918 aux USA cette variété est absente des pommes remarquables En 1926 Golden Delicious fut introduite en Angleterre. Ce n'est qu'en 1961 que la variété fut inscrite dans le catalogue officiel de l'INRA L'Algérie, la Vallée du Rhône, la Touraine et Pays de Loire furent parmi les premiers gros producteurs. Depuis il y a eu de nombreuses mutations, de nombreux croisements volontaires donnant de nouvelles variétés dites « modernes ». Maintenant répandue dans le monde entier là où les pommiers s'acclimatent

**SYNONYMES :** Gelber Köstlicher.



#### DESCRIPTION DE LA VARIETE PRIMAIRE :

**MATURITE-CONSOMMATION :** Octobre/novembre-fin janvier en cave naturelle. Jusqu'à fin juin en Atmosphère Contrôlée.

**FORME :** Grosse à moyenne. Plus large, bien que semblant plus haut, conique donc plus étroite côté cuvette de l'œil.(de nouveaux types semblent ovoïdes) Parfois légères côtes au pourtour (variété primaire)

**EPIDERME :** Lisse, sec, jaune d'or. Parfois fauves. Un peu marbré et (ou) strié de rouge ou de rose sur ¼(variété primaire) Lenticelles bien visibles gris cendré, parfois un peu anguleuses.

**CUVETTE du PEDONCULE :** Large, profonde, évasée, à peine fauve au fond.

**PEDONCULE :** Très remarquable par sa finesse et sa grande longueur. Plus large à l'attache.

**CUVETTE de L'ŒIL :** Etroite, profonde à mi profonde, finement côtelée.

**L'ŒIL :** Moyen et clos.

**CHAIR :** Jaunâtre, croquante, fine, juteuse, très sucrée, arôme « vanillé » selon le mode de culture, sous acidulée, presque à la limite du critère « doux » surtout en fin de conservation prolongée.

**CRITERE SPECIAL :**

**LOGES :** Hautes, fermées ou mi closes au centre, lisses ou feutrées.

**OBSERVATIONS :** Sensible aux maladies à virus et surtout la tavelure sur fruits. Floraison mi tardive et fertile. Vigueur de l'arbre moyenne, fructification sur rameaux de un an, mise à fruits rapide. Pas d'alternance. Pollinisée par Akane, Cassou, Reine des Reinettes, Reinette Clochard et d'autres.

**REFERENCES :** Choisel Jean-Louis.

**BIBLIOGRAPHIE :** Pomologie, 1949, Kessler, Suisse. (Description erronée dans Le Verger Français, 1948).