


## GRAND ' MERE

©Choisel jl 2001-2004



Photos Choisel Jean-Louis 2004-©

ORIGINE : Déjà connue en 1915 dans la vallée de la Loire. Cultivée aussi en Auvergne avant 1848, et dans l'Ariège (Sabine), Mayenne, et, donc en Touraine, Maine-et-Loire. Encore conservée à Brogdale (« the Book of Apples », 1993, p.214.)

SYNONYMES : Jaune d'Angers, Faux Canada d'Anjou, Pomme de Barrière, Reinette Grand'Mère, Sabine (en Ariège).

Ne pas confondre avec Bonne Hotture.

MATURITE-CONSOMMATION : Décembre-Mars.

FORME : Moyen à plus. Plus large, conique, parfois asymétrique, pourtour avec côtes sur certains fruits, sinon pourtour pas trop irrégulier. Apparence d'une Reinette Blanche du Canada.

EPIDERME : Mi rugueux à rugueux, jaune, un peu voilé ou, même, lavé de rose ou de rouge brique à l'insolation (1/8, 1/4, 1/2), ou pas. Finement tramé ou réticulé de fauve sur la surface et, surtout maculé ou lavé de fauve ou de brun clair ou doré vers le pédoncule. Lenticelles rousses et anguleuses, assez visibles. Peau épaisse.

CUVETTE du PEDONCULE : Etroite, peu à assez profonde, irrégulière, parfois mamelonnée, plaquée de fauve doré (ou brun clair) en tache irrégulière et dépassante du sommet..

PEDONCULE : Gros et court ne dépassant pas, ou grêle et long, dépassant alors du sommet.

CUVETTE de L'ŒIL : Mi-profonde, étroite ou mi large, plissée ou un peu côtelée, souvent tachée de traces fauves circulaires autour de la cuvette.

ŒIL : Petit, clos ou mi clos.

CHAIR : Blanc-jaunâtre (pas rose comme sur le cliché), croquante, ferme devenant tendre puis farineuse avec l'avancée de la maturité vers javier, sucrée, juteuse, acidulée, relevée comme une Reinette, bien bonne. Très résistante aux chocs et transports en vrac.

LOGES à PEPINS : Plus hautes, closes, non feutrées, sinon peu. Parfois un peu fendillées.

OBSERVATIONS : Arbre très vigoureux, très érigé, à rameaux aux lenticelles rares, saillantes, rondes. Yeux petits, très collés à l'écorce. Feuilles moyennes, à dentelure irrégulièrement profonde et à pétiole grêle. Floraison mi tardive. Bon pollinisateur était planté avec d'autres variétés à mauvais pollen. Fleuri après Rette Clochard, Rette Baumann, Reine des Rettes et avant Crâvert, De Jaune, Pépin de Bourgueil. Pousse en tout terrains (argileux, calcaires, sablonneux). Résiste aux maladies sauf celle du liège et à la « fumée ».

BIBLIOGRAPHIE : Le Verger français, t.2, 1948, p.440.- Vercier, 1934, p.290.- « Pommier à Couteau... », P.F.L'Evêque, 1946, Le Mans (cliché de l'arbre ici).-

REFERENCES : Choisel J.L. « Guide des Pommes », 1991, 1996, P.80, éditions Hervas, Paris.- Choisel coupe, photo couleurs ici et étude de février 1981 et 2001 et janvier 2004.