


# GROS FENOUILLET GRIS

FICHER CHOISEL JEAN-LOUIS©2001

ORIGINE : Signalée en 1667 par Merlet « Abrégé des bons fruits » 1<sup>ère</sup> édition, p.152. et par Duhamel, en 1768, « Traité des arbres fruitiers », t.1, p.288. C'est la Reinette douce du « Catalogue descriptif des arbres fruitiers les plus recherchés et les plus estimés qui peuvent se cultiver dans la haute Alsace » F.J. Baumann, 1788, p.120. Encore cultivé en 1916 chez Leroy d'Angers et, en 1936, chez Pinguet-Guindon à Tours. Conservé à Brogdale « the Book of Apples », 1993, p.216. Conservé par R.Jahan.



SYNONYMES : Reinette Douce, Pomme d'Anis, Fenouillet gris, Fenouillet gros (le Verger français, 1948, p.392- Vercier, 1934, p.282). Confondue à tort avec Reinette Dorée de la Sarthe (Chez Raymond Jahan) ;

MATURITE-CONSOMMATION : Décembre-Mars. (février chez Baumann et à Brogdale).

FORME : Plus que moyen à gros. L=80mm., H=62mm.-Plus large, Conique ou sphéroïdale, pôles aplatis, un peu asymétrique côté cuvette du pédoncule.

EPIDERME : Rugueux, épais, jaune grisâtre côté ombre, brun-rougeâtre côté insolation, plus ou moins marqué de gris-roux, granité-réticulé de fauve squameux. (Baumann=épiderme gris presque ventre de biche=Larousse : blanc-roussâtre). Lenticelles brun-clair assez visibles.

CUVETTE du PEDONCULE : Large, évasée, profonde .

PEDONCULE : Gros, renflé à l'attache, court, ne dépasse pas.

CUVETTE de L'ŒIL : Large (33mm ;), profonde, unie, parfois côtes au pourtour du sommet.

ŒIL : Moyen à gros, profond sous les sépales, ouvert à clos.

CHAIR : Blanc-verdâtre, fine, compacte, mais tendre, juteuse, très sucrée, sans flaveur remarquable, complètement douce(Baumann a écrit : c'est un fruit pour les femmes).

LOGES à PEPINS : Pas très grosses, closes, pas ou à peine fendillées.

OBSERVATIONS : Arbre vigoureux, à rameaux très cotonneux ayant de petites lenticelles allongées et nombreuses.Yeux gros, duveteux, arrondis, à peine collés à l'écorce.Feuilles petites, régulièrement dentelées à pétiole raide de dimensions moyennes, presque sans cannelure. Fertilité médiocre.

REFERENCES : A .Leroy, Angers, 1873, « Dictionnaire de Pomologie », n°197 et Choisel J.L (étude, coupe, photo en octobre 1994).