

GROSSE REINETTE DE CASSEL ©fichier choisel-2001-2005-2007.


ORIGINE : Hollande. Cultivée vers Metz vers 1860 et en Allemagne avant 1801. Décrite par Heidemij dans "De Nederlandsche Boomguard", en 1868, pl.29, n°57 en couleurs ici. Décrite par Mas "Le Verger", 1868, t.4, n°1 mais Il donne faussement le synonyme Dutch Mignonne dont A.Leroy dit que c'est celui de Reinette de Caux. Cultivée chez Leroy avant 1873.

SYNONYMES : Double Reinette de Cassel (Diel, "Kernobstsorten", 1801, t.IV, p.140).- Grosse Casseler Reinette(d°).- Reinette Dorée de Hollande(Dittrich, "Systematisches Handbuch der Obstkunde", 1839, t.I, p.429, n°425).- Reinette Parmaine Rouge(baron de Biedenfeld, "Handbuch aller bekannten Obstsorten", 1854, 2° partie, p.107).- Reinette Piquée(d°).- Contor(Nicolas Gaucher, Allemagne, 1894, Pomologie de l'Arboriculteur) - Choist Gold Reinette(d°)-Copmanthorpe(d°)- Cab(d°)-Copmanshorpe Russet(d°)-Cooft Angry(d°)- Deutsche Gold reinette(d°)-Pomme Pater Noster(d°)-Pomme de Laah(d°)-Ravole Reinette(d°)-Reinette de Caux(d°-à tort)-Reinette Impératrice(d°)-White Dutch Mignonne(d°).

Ne pas confondre avec Reinette Caractère ni avec Peamain Royal, ni avec Dutch Mignonne. Ni avec REINETTE de CAUX par les synonymes.



W.Lauche Deutsche Pomologie 1880/82.



R.Stoll 1888 Pomologie en Autriche.

MATURITE-CONSOMMATION : Janvier-Avril ou plus.

FORME : Très grosse, L=76mm., H=66mm.- Plus large, sphéroïdale régulière.

EPIDERME : Assez lisse , parfois un peu rugueux, jaune d'or passant au jaune orangé côté insolation, faiblement ou assez strié de rose ou de rouge à l'insolation. Lenticelles rousses, régulières , caractéristiques. Eventuelles traces fauves

CUVETTE du PEDONCULE : Large, profonde, brun clair.

PEDONCULE : Gros, long, arqué, dépasse.

CUVETTE de L'ŒIL : Large(31mm.), profonde, unie ou plissée.

ŒIL : Moyen, mi clos.

CHAIR : Blanc jaunâtre, ou verdâtre, serrée, ferme, très croquante, un peu marcescente, juteuse, acidulée, sucrée, parfumée mais à arrière goût plus ou moins herbacé. Deuxième qualité. Table et cidre.

LOGES : en goutte d'eau, moyennes mais plus hautes que larges, feutrées(selon Lauche) ou



lisses selon Diel, Lucas :

Diel..

OBSERVATIONS : Arbre vigoureux à rameaux étalés très cotonneux aux grandes lenticelles clairsemées. Yeux collés contre l'écorce. Feuilles moyennes finement crénelées au pétiole de moyennes dimensions, non cannelé. Très fertile. Supporte les froids sévères du Nord. Vient bien à environ 600m. d'altitude.

REFERENCES : Choisel-2005

BIBLIOGRAPHIE : A.Leroy, Angers, 1873, "Dictionnaire de Pomologie", n°206, silhouette ici. Premier congrès commercial de la pomme de table, les 26 et 27 juin 1926, Bourges, p.349, fig.129: cliché colorié par choisel j.l. ici.- Heidemij déjà cité (gravure couleurs)- Nicolas Gaucher , Allemagne , 1894 , Pomologie de l'Arboriculteur. Lauche 1880/83.

Premier congrès commercial de la pomme de table, les 26 et 27 juin 1926, Bourges, p.349, fig.129: cliché colorié par choisel j.l. ici.- Heidemij déjà cité (gravure couleurs)- Nicolas Gaucher , Allemagne , 1894 , Pomologie de l'Arboriculteur. Lauche 1880/83. Rudolf Stoll 1888 Pomologie en Autriche.