



## JOSEPHINE

©2001 choisel j l

**ORIGINE:** C'est le comte de Lieur qui, vers 1803, l'apporta en France, depuis l'Amérique qui n'est pas son pays d'origine. L'obteneur serait M. Maszman, horticulteur à Hanovre, Allemagne. Cette variété a probablement été introduite en Amérique par des émigrants. Le nom Joséphine fut attribué par Poiteau « Pomologie Française », 1846, t.IV, n°49, et par Turpin, en souvenir de l'impératrice. Joséphine est cultivée à Brogdale, Kent, Angleterre, où elle fut envoyée depuis la France en 1947. (N° de culture 8 L D.). Auparavant ce pays la connu en 1817. L'américain Charles Downing, 1869, « Fruits of America », p.191, écrit que l'origine de cette variété lui est inconnue.

**SYNONYMES :** Baltimore (Sté. D'Horticulture de Londres, « Transactions », 1817, t.III, pp.119-120). - Monstrous Pippin (William Coxe, View of the cultivation of fruit trees, 1817, p.117). - Mammoth (Hugh Ronalds, 1831). - Melon, (Louis Noiset, « Le Jardin fruitier », 1839, t.I, p.200, n°24). - Impératrice Joséphine (Utin, « Annales de Flore et de Pomone », 1840-1841, pp.84-85). - Américan Gloria Mundi (Thompson, « Catalogue of fruits cultivés au garden de Horticultural Society de Londres, 1842, p.17, n°271). - American Mammoth (d°). - Glazenwood Gloria Mundi (d°). - New-York Gloria Mundi (d°). 6 Belle Joséphine (Alexandre Bivort, « Album de Pomologie », 1851, t.IV, p.5) (Jean-Louis Choisel, « J'identifie mes pommes anciennes », p.26, n°4., 1980, édité en 1984). - Gloria Mundi (Duval « Histoire du pommier... », 1852, p.55, n°28). - Monstrueuse Pippin (Congrès pomologique 1859-1860, p.5).

Ne pas confondre avec le Baltimore américain, ni avec Monmouth Pippin (Amérique), ni avec Monstous Pepping (Allemagne), ni avec Belle du Bois, ni avec Ménagère, ni avec Belle Joséphine de la Brie.

**MATURITE-CONSOMMATION :** Novembre-Mars. (alors que Belle du Bois = Septembre-Février chez nous et décembre-mars pour Leroy).

**FORME :** Très grosse, L=100mm., H=96mm. - Plus large. Tantôt conique, tantôt sphéroïdale. Toujours pentagonale. Un peu asymétrique.

**EPIDERME** : Assez épais, lisse, jaune clair verdâtre(lenticelles blanches) côté ombre, jaune un peu brunâtre côté insolation. Parfois quelques mouchetures vermillonnées ou voiles rose-orangé. Lenticelles fines brunes(entourées d'un halo clair).

**CUVETTE du PEDONCULE** Très large, profonde, évasée, fauve olivâtre débordant peu ou assez en « rayons » ou en « tache ».

**PEDONCULE** :Gros, très court, dépasse rarement la mi hauteur de la cuvette.

**CUVETTE de L'ŒIL** :Très large, évasée, moyen à bien profonde, côtelée, un peu plissée.

**ŒIL** : Très grand (parfois 13mm.de Diamètre), Très profond sous sépales, ouvert ou mi ouvert. Pas de gris.

**CHAIR** : Blanc un peu jaunâtre, mi fine, mi tendre, juteuse, sucrée- acidulé équilibré, assez savoureuse mais sans parfum marquant. Devient vite farineuse.

**LOGES à PEPINS** : Grosses, hautes, bien feutrées, ouvertes.-H/L=20/13, 21/17 : 19/12, 20/14, 25 /12.

**OBSERVATIONS** : Arbre vigoureux à rameaux duveteux, brun-olivâtre, à lenticelles petites, rondes, très rapprochées. Yeux gros, ovoïde-obtus, écartés de l'écorce et aux écailles écartées, duveteuses. Feuilles grandes, très dentelées et surdentelées, à pétiole court, très gros, peu cannelé, rosé dessous.

**REFERENCES** : A.Leroy, Dictionnaire de Pomologie, t.3, 1873, n°238. et Jean Louis Choisel étude , photos coupes.©2001

**BIBLIOGRAPHIE**: Dans le texte.