

KENTUCKY ROUGE STRIEE

©Fichier choisel 2002-2012.



- silhouette A.LEROY 1873 coloriée choisel

ORIGINE : USA, 1864. Propagée par André Leroy d'Angers avant 1873. Conservée à Brogdale (the book of apples, 1993, p.225).

SYNONYMES : Kentuchy Streak(1867)- Bradford's Best- Kentucky Red Streak.Bradford.



Auteur ancien inconnu.U.S.A.

MATURITE-CONSOMMATION : Janvier-Avril.

FORME : Moyenne. Plus large ou H=L ou plus haut, conique ou globuleux.

EPIDERME : Vert clair brunâtre tout ou presque lavé, marbré, strié de rouge sombre. Lenticelles fauves nombreuses bien visibles.

CUVETTE du PEDONCULE : Largeur variable , assez profonde.

PEDONCULE : Dimensions moyennes, dépasse un peu ou non.

CUVETTE de L'ŒIL : Petite, irrégulière, bosselée.

L'ŒIL :

CHAIR : Verdâtre, ferme, fine, juteuse, acidulée, sucrée.

OBSERVATIONS : Lenticelles sur bois nombreuses, grandes.

REFERENCES : choisel

BIBLIOGRAPHIE : A.Leroy, Angers, 1873, Dictionnaire de Pomologie, n°242.et silhouette.