


LEAVER (02.07)-J-

ORIGINE : Pomania, Caroline du Sud, USA, avant 1866, année où A.Leroy d'Angers l'a reçu. Le pépiniériste William Summer de Pomania l'a fait connaître, en 1867, au Congrès pomologique américain. Encore dans le catalogue Leroy à Angers en 1916.

SYNONYMES : Lever(William Summer, "Americain pomological Society", 1867, p.184)

MATURITE-CONSOMMATION : Février-Juillet, ce qui est rare.

FORME : Deux types. Moyenne ou plus. Type1 conique allongé, H=L :74mm. sur 74mm ou plus haut- Type 2 conique bas L=74mm., H=64mm.- Asymétrique et un peu pentagone côté cuvette de l'oeil.



Photos J.Cl.Grandjean

2007-Sous réserve d'authenticité.

EPIDERME : Epais, parfois un peu rugueux, jaune verdâtre clair, un peu voilé de rose à l'insolation. Fortement ponctué de brun.

CUVETTE du PEDONCULE : Etroite, très profonde, rousse.

PEDONCULE : Gros, assez long, plus gros à l'attache, dépasse ou non.

CUVETTE de L'ŒIL : Large (21 à 28mm.), rarement très profonde, fortement plissée, rousse.

ŒIL : Grand à moyen, ouvert ou mi clos, à longs sépales.

CHAIR : Blanchâtre, mi fine, très ferme, très résistante, juteuse, bien sucrée, agréablement acidulée, faiblement parfumée, deuxième qualité.

LOGES à PEPINS : Feutrées

OBSERVATIONS : Rameaux étalés à grandes et nombreuses lenticelles . Petits yeux fortement collés à l'écorce et plats. Feuilles profondément dentelées à long et frêle pétiole.

REFERENCES : A.Leroy, Angers, 1873, "Dictionnaire de Pomologie", n°248.(silhouettes ici).