



MOISSON RAYÉE ROUGE (Ete).R.

FICHIER CHOISEL J.L. (Reproduction Interdite).© 1980-2001

ORIGINE: J'ai trouvé cette ancienne variété, vers 1980 à Courtelevant, Territoire de Belfort. Elle diffère de Borowitsky et de Moisson Rayée Rouge Retardée.

SYNONYMES:

MATURITE.CONSOMMATION:Début à fin août maxi. En 1982., alors que Borowitsky la même année :15 août à fin septembre.

FORME: Moyenne. Plus large, un peu conique, pourtour un peu irrégulier.

EPIDERME: Lisse, jaune pâle, lavé et strié de rouge, comme Borowitsky.

CUVETTE du PEDONCULE: Etroite, moyen-profond,fauve rayonnant comme Borovitsky. Alors que Borovitsky est plus large, plus profonde et évasée.

PEDONCULE: Plus gros et souvent assez court.

CUVETTE de L'ŒIL: Très étroite,peu profonde, presque nulle, très rétrécie-cônique. Donc moins large que Borovitsky. On ne remarque pas les 5 petites glandes autour de l'œil comme dans Borovitsky, donc la cuvette de Moisson Rayée Rouge est régulière.

ŒIL: Petit (5mm.), clos. Cavité sous l'œil profonde et allongée (peu profonde pour Borowitsky).

CHAIR: Peu acidulée (Borowitsky est acidulée), peu sucrée, peu juteuse, farineuse. D'un blanc plus net avec des traces roses sous la peau et aux segments libéro-ligneux vers le cœur.



LOGES à PEPINS: Semblables à celles de Borowitsky mais un peu plus larges., feutrées, non ouvertes.

OBSERVATIONS:Au 25/08/85 la chair est déjà brune au pourtour et vers le cœur, alors que celle de Borowitsky est de maturité peu avancée.

REFERENCES: Jean-Louis Choisel.(Etude et photo et coupes).©1980-2001