


## PENNINGTON (10.02)-J-

Fichier choisel 2000-2012



silhouette A.LEROY 1873 coloriée choisel

**ORIGINE** : Première récolte en 1830, dans le jardin de la Société d'Horticulture de Londres à Chiswick. Première description: par George Lindley, 1831, "Guide to the orchard and kitchen garden", p.93, n° 178. Cultivée chez Leroy, Angers dès 1863 environ.

**SYNONYMES** : Pennington's Seedling (Charles Downing "the Fruits and fruit trees of America", 1863, p.220).

**MATURITE-CONSOMMATION** : Octobre-Février.

**FORME** : Sous moyenne, L=66mm., H=53mm.- Plus large, sphéro-conique, un peu comprimée aux pôles.

**EPIDERME** : Vert clair jaunâtre côté ombre, jaune brunâtre et veiné de rouge côté insolation. Fortement ponctué et tacheté de gris.

**CUVETTE du PEDONCULE** : Etroite, peu profonde.

**PEDONCULE** : Ligneux, gros surtout à sa base, assez court mais dépasse un peu à cause de la cuvette peu profonde.

**CUVETTE de L'ŒIL** : Large(24mm.) mais peu profonde, plissée.

**ŒIL** : Grand, mi clos ou clos, à longs sépales.

**CHAIR** : Blanchâtre, mi fine, assez ferme, très juteuse, acidulée, sucrée, plus ou moins aromatique, deuxième qualité.

**LOGES à PEPINS** :

**CRITERE SPECIAL:**

**OBSERVATIONS :** Arbre vigoureux à rameaux bien cotonneux, presque érigés, à grandes et nombreuses lenticelles. Yeux petits à moyens, duveteux, tout collés à l'écorce. Feuilles petites à moyennes, arrondies, assez profondément dentelées, à court et gros pétiole.

**REFERENCES :** choisel

**BIBLIOGRAPHIE :** A.Leroy, Angers, 1873, "Dictionnaire de Pomologie", n°326.(silhouette ici).