



PRIMEROUGE

© choisel jean-louis-2001

(Eté-Automne)

ORIGINE: Croisement de Jonathan avec Worcester Pearmain, au Japon, vers 1970.

SYNONYMES: Akane(voir cette fiche), Tohohu, Tokyo Rose, Prim Red.

MATURITE.CONSOMMATION: Fin août-Mi Septembre, et mi-Novembre à 4°C.

FORME :Sphéroidale, plus large, un peu rétrécie du côté cuvette de l'œil. Pourtour régulier.

EPIDERME: Fond jaune, lavé de rouge lumineux, à 75 pour cent. Lenticelles petites et claires.

CUVETTE du PEDONCULE: Profonde, gris rouille rayonnant.

PEDONCULE: Dépasse le sommet de moins un centimètre, plus gros à l'attache.

CUVETTE de L'ŒIL: Faiblement côtelée, largeur moyenne.

ŒIL:

CHAIR: Blanche, parfois un peu rose.



LOGES à PEPINS: Plus hautes, non feutrées, ouvertes.



CARACTERES PARTICULIERS:

OBSERVATIONS: Photos, coupes : choisel jean-louis© 2001

BIBLIOGRAPHIE:: 100 Variétés de Fruits, 1983, Suisse, IMZ, 3052, Zollikofen.