



QUERINA FLORINA (fin09-10+)-R

© choisel jean-louis-2001-2009.

ORIGINE : INRA Angers. Hybride résistante à la tavelure de *Malus floribunda*, Rome Beauty, Golden D., Starking, Jonathan en croisements échelonnés, avant 1979.

SYNONYMES : Florina.

Ne pas confondre avec l'épiderme de Double Belle Fleur Rouge de l'Indre dont le pédoncule est plus court et les lenticelles grises un peu anguleuses.

MATURITE-CONSOMMATION : Fin septembre – Octobre et +

FORME : Moyenne, L=74mm., H=64mm.- Plus large, sphéroïdale ou conique, pourtour irrégulier, un peu asymétrique vers l'œil.

EPIDERME : Lisse, brillant, jaune clair presque tout lavé de rouge sombre, stries peu visibles rouge-noir. Lenticelles nombreuses blanches, visibles. Pruine blanchâtre.

CUVETTE DU PEDONCULE : Large à plus petite, évasée, profonde, gris-vert rayonnant ne dépassant pas du sommet.

PEDONCULE : Mi long, dépasse ou non, plus gros à l'attache, dépasse de moins un cm.

CUVETTE DE L'ŒIL : Largeur moyenne, profonde ou non, évasée, à peine plissée, mamelonnée au sommet. Pas de gris mais nombreuses petites lenticelles blanches proches et dans la cuvette.

ŒIL :Moyen à plus (7à8mm), mi clos .

CHAIR : au 2/10/94. Blanchâtre, filaments jaunes, cassante, juteuse, sucrée, peu acidulée, goût « américain ».

LOGES à PEPINS : Hautes, étroites, à peine fendillées, pas ou peu ouvertes.

CARACTERES PARTICULIERS :

OBSERVATIONS : En 2006, après 20 ans d'études, l'INRA d'Angers a créée la pomme dans tavelure ARIANE, issue du croisement : Golden X Querina Florina X Prima.

REFERENCES : Choisel(photos, coupe descriptions. Photo du bas : fruits pas à maturité). © 2001-Vergers de Touraine.(variété récente).