

# RAMBOUR BLANC

© fichier choisel J.L.-2002



**ORIGINE :** Cultivé dans les régions Nord de la France, l'Alsace, le Doubs, le Territoire de Belfort et probablement ailleurs. Similitudes avec Rambour d'Eté mais semble être un dérivé de la même famille.

**SYNONYMES :**

**MATURITE-CONSOMMATION :** Octobre-Novembre. Pour « les pommes du Nord », 1996, p.121. Fruits que j'ai observés : ne dépasse pas fin octobre.

**FORME :** Très grosse. Plus large, sphéroïdale, parfois un peu conique, pourtour un peu irrégulier.

**EPIDERME :** Lisse, d'abord verdâtre puis progressivement jaune tirant sur le blanc à maturité, avec ou non des traces fauves. Lenticelles claires non évidentes. Il y a trois types de coloration qui dépendent de l'intensité de l'insolation : Fruits verdâtres puis tout jaune tirant sur le blanc, puis les mêmes plus ou moins striés de rouge, puis les mêmes un peu colorés de rouge.

CUVETTE DU PEDONCULE : Moyenne , fauve ou non.

PEDONCULE : Gros , court , en général ne dépasse pas mais , parfois , dépasse le sommet.

CUVETTE DE L'ŒIL : Large à moyenne, profonde , côtelée pour certains fruits ; fauve ou non

ŒIL : Grand , mi clos.

CHAIR : Blanche à blanchâtre, mi fine ou moins fine , juteuse , tendre , sucrée , acidulée.  
Plus tendre que la peau.

LOGES à PEPINS : Closes, fendillées

CARACTERES PARTICULIERS : non.

REFERENCES : Choisel jean louis 1984 travaux sur Jean Bauhin, Sté D'émulation du Pays de Montbéliard. Photo choisel.

BIBLIOGRAPHIE: : « Les pommes du Nord », 1996, p.121, fruits trouvés dans l'Aisne, et le Nord.