

RAMBOUR D'HIVER © choisel jean-louis 2001/2011

ORIGINE : Cité pour la première fois par Jean Bauhin avant 1612 , puis par le Lectier , en 1628. Encore vendu chez Leroy ' Angers , en 1916 et 1935 et chez Pinguet-Guindon de Tours vers 1936. Courant dans l'Est de la France.

SYNONYMES : Rambourg Rouge (le Lectier , 1628) , Rambour Doux (dom Claude St Etienne, 1670) , De Montjoie, Lothringer Rambourg(ou Rambour des Lorrains) à tort car c'est le synonyme de Rambour d'Eté. Pour autres synonymes voir le tableau sur logiciel.

Ne pas confondre avec Rambour Papeleu(décrit dans le Guide des Pommes) ni avec Rambour Rouge de Lorraine.

NOTE IMPORTANTE:

Il existe des confusions. Ceci est dû à une grande quantité du type Rambour et au fait que certains pomologues du 19^e siècle(et actuels) n'étaient pas toujours d'accord dans leurs descriptions.

Dans cette fiche j'ai cru bon de faire quelques retours en arrière.

Jaumes Saint Hilaire (1772/1845), « Flore et la Pomone Française » représente le Rambour d'Hiver comme ceci:



Remarquez que les cuvettes sont côtelées .Dans vos recherches elles doivent l'être.

Curieusement en 1868 , dans Pomologische Monatshefte, Ed.Lucas décrit un Rambour d'Hiver de Runkels qui, on ne sait depuis quelle date, viendrait d'un semi réalisé par le jardinier Runkels de Kremsmünster en Autriche. Or ce type est également ressemblant, voici la vue :



Autre type :

Chez Thomas, Guide Pratique cité par le pomologue allemand Lucas dans Pomologisthe Monatshefte (avant 1890) nous avons une autre pomme (ci dessous):



Ce type est confirmé dans Le Verger Français 1948. dans Les Belles Pommes du Haut-Rhin dès 1934, dans Pommes d'Alsace et des Vosges de Philippe Girardin 1993, dans Les Meilleurs Fruits du XX^e siècle (Sté Nationale d'Horticulture de France) 1907, ...

Chez A.Leroy, en 1873, Dictionnaire de Pomologie seule la silhouette représentée ne correspond pas.

Conclusion: il y a au moins 2 types de RAMBOUR D'HIVER non compris les variétés différentes qui portent le synonyme.

MATURITE/CONSOMMATION : Novembre-Mars pour tous les types cités..

FORME : Grosse. Plus large ou H=L, tantôt sphéroïdale, souvent conique, pourtour

irrégulier , asymétrique.

EPIDERME : Lisse, jaune presque tout lavé de rouge passant du clair au foncé , fouetté , par endroits , de stries .Lenticelles gris blanchâtre plus ou moins évidente selon les fruits .

CUVETTE du PEDONCULE : Large, évasée , profonde, gris fauve rayonnant.

PEDONCULE : Gros, court.

CUVETTE de L'OEIL : Large , évasée , profonde , un peu plissée , côtelée, parfois traces de fauve.

OEIL : Grand ; ouvert ou mi clos.

CHAIR : Blanc-jaunâtre, mi tendre, juteuse, acidulée sous-moyen, plus ou moins sucrée , sans saveur bien nette . Très utilisée pour cuisson, pâtisseries.

LOGES à PEPINS : Closes, feutrées.

CARACTERES PARTICULIERS :

OBSERVATIONS :

REFERENCES : Voir le texte.

BIBLIOGRAPHIE : Pommes d'Alsace et des Vosges, p.80/81 Philippe Girardin et Bruno Ferry, éditions du Rhin , Mulhouse, 1993 .- Guide des Pommes , jean-Louis Choisel , p.109 (gouache de Philippe Voisard) , 1991/96 , éditions Hervas , Paris.- Catalogue de la Sté Pomologique de France, 1927 , p.550 (description peu évidente). André Leroy, Angers , 1873 , n°358 , Dictionnaire de Pomologie. Et voir texte.