



RAMBOUR DE PLEISSEN

Fichier Choisel©2000-2008.



Pastel Choisel©2003.



W.Lauche Deutsche Pomologie, 1882/83.

ORIGINE : Saxe, Allemagne, avant 1805. Chez Leroy d'Angers depuis 1868 qui l'a reçu du docteur Lucas directeur de l'Institut pomologique de Reutlingen, Wurtemberg. On peut encore trouver ce Rambour dans l'Est de la France et en Allemagne. Il a été cultivé en Ukraine au 20^e siècle et peut-être encore maintenant.



Von Goethe, 1900, Deutsche Kernobstsorten.

SYNONYMES : Pleissner Sommerrambour (Diel, « Kernobstsorten », 1805, t.7, p.109. et voir liste des synonymes.

:

MATURITE-CONSOMMATION : Octobre-Novembre-Janvier.

FORME : Volumineuse, L=91mm., H=82mm.- Conique, très côtelée, asymétrique. Plus large.

EPIDERME :Jaune terne, légèrement marbrée et striée de carmin. Lenticelles rares, gris-brun.

CUVETTE du PEDONCULE :Etroite, profonde, un peu fauve.

PEDONCULE :Très gros, court, arqué, oblique, ne dépasse pas.

CUVETTE de L'ŒIL :Assez développée, très irrégulière, côtelée ou bosselée.

ŒIL : Grand, très ouvert, très cotonneux.

CHAIR :Blanche à blanc-jaunâtre, mi fine, mi tendre, juteuse, sucrée, agréablement acidulée, presque sans parfum.



LOGES à PEPINS : Ouvertes, feutrées ou fendillées

n°181 Diel-Lucas. Ou



hautes, ouvertes, lisses encore autre version de Diel-Lucas 1855, n°209 Illustr.

CARACTERES PARTICULIERS :

OBSERVATIONS : Arbre de force moyenne, à rameaux duveteux ayant des lenticelles grandes , clairsemées. Yeux Petits ou moyens, très cotonneux, noyés dans l'écorce. Feuilles profondément dentelées, à gros et court pétiole sans cannelure.

REFERENCES : Choisel.

BIBLIOGRAPHIE : A.Leroy, Angers, « Dictionnaire de Pomologie », 1873, n°359. Lauche.

