


RATEAU

©Fichier choisel 2002-2012



silhouette A.LEROY 1873 coloriée choisel

ORIGINE : Ancienne, inconnue. Présente en Seine-Maritime avant 1360. Propagé en France et à l'étranger par les pépinières Leroy d'Angers au 19^e siècle et début du 20^e.

SYNONYMES : De Resté(1360 en Seine-Maritime)- De Rateau(1540)- De Resteau(1652).

MATURITE-CONSOMMATION : Décembre-Février.

FORME : Moyenne. Plus large, sphéroïdale, un peu conique, aplatie côté pôle du pédoncule.

EPIDERME : Lisse, épais, jaune clair-verdâtre, strié de rose pâle côté ombre et lavé strié de carmin à l'insolation. Lenticelles brun-roux, nombreuses.

CUVETTE du PEDONCULE : Etroite, profonde, fauve.

PEDONCULE : Gros, très renflé à l'attache, court, oblique.

CUVETTE de L'ŒIL : Large à moyenne, profonde à moyenne, fauve, unie ou plissée.

L'ŒIL : Moyen.

CHAIR : Blanche, ferme, mi fine, juteuse, sucrée, acidulée, peu parfumée.

OBSERVATIONS : Lenticelles sur rameaux petites, rondes, clairsemées.

REFERENCES : choisel

BIBLIOGRAPHIE : A.Leroy, Angers, 1873, Dictionnaire de Pomologie, n°361.

