


## REINE DES REINETTES

©fichier choisel-2000-2006.

**ORIGINE :** Hollande vers 1770. Encore vendue dans le commerce. Elle a donnée naissance à plus de dix types différents. Cultivée sur l'île de La Réunion avec Belreine qui est un mutant de Reine des Reinettes obtenu par l'INRA d'Angers par un traitement au méthane sulfonate d'éthyle , ce qui donne des fruits plus colorés.



Deutsche Pomologie, W.Lauche, 1880. Winter Goldparmaene.



W.Lauche Deutsche Pomologie autre type.

**SYNONYMES :** Kronen Reinette (Van Mons Belgique , de 1798 à 1823) - Kroon Renet (Diel , Allemagne , 1802) - De la Reine(Forsyth , angleterre , 1805) - Reinette Rousse(Diel , 1807 et Lucas, Allemagne , 1859, ne pas confondre avec Reinette des Carmes qui porte ce synonyme donné en 1768 par Duhamel) - Königin der Renetten(baron de Biedenfeld, Allemagne , 1854) - Queen of the Pippin(Van Mons , Belgique , 1857) - Reinette de la Couronne(1858 , France) - Röthliche Reinette , Lucas, 1859) - Feuerröthliche Reinette(d°) - King of the Pippins en Angleterre - Wintergoldparmane et Pearmain doré d'hiver en Suisse.

**MATURITE-CONSOMMATION :** Décembre-Mars(Leroy , 1873) , le type cultivé vers les années 1920(Larousse agricole de 1922) : Octobre-Mars - Vers les années 1930 : Septembre à mi novembre en conservation naturelle , et plus longtemps en frigo.(jusqu'à fin décembre).

**FORME :** Moyenne. Plus large ,cylindro- conique , pourtour régulier , un peu aplati côté cuvette de l'œil.

**EPIDERME :** lisse , sèche , épaisse , jaune , flammé d'orangé et de rouge(1/4 à plus) avec des stries rouge vif . Lenticelles grises, moyennes, parfois assez visibles. Parfois traces fauves.

**CUVETTE du PEDONCULE :** Etroite à plus large, profondeur moyenne, gris-vert.

**PEDONCULE :** Dimensions moyennes ou gros.

**CUVETTE de L'ŒIL :** Large , profonde à moyenne , unie ou un peu plissée , traces fauves.

**L'ŒIL :** Grand mi clos ou ouvert.

**CHAIR :** Blanchâtre(Leroy et Catalogue Sté Pomologique de France , 1927) , Blanc-jaunâtre (Annales de pomologie belge et étrangère , 19° siècle)caractéristique sur le type ancien encore cultivé. Ferme , fine , moyen-juteuse , sucrée , moyen à sous acidulée et à saveur agréable bien caractéristique.

**LOGES à PEPINS :** Hautes, bien feutrées, mi ouvertes(Kessler) ou lisses, closes (un des types



décrit par Diel, Lucas 1855 :

**OBSERVATIONS :** Arbre vigoureux, fertile. Lenticelles sur bois très grandes et nombreuses (Leroy , 1873).

**REFERENCES :** Choisel jean-louis



photo Choisel jean-louis septembre 2012©

**BIBLIOGRAPHIE :** A.Leroy , Angers, 1873, Dictionnaire de pomologie , n°364 ,silhouette en haut gauche - Heidemij , De Nederlandsche Boomguard , 1868 , pl.1 , vue couleur en haut droite.- Larousse agricole , 1922 vue couleur bas gauche -H.Kessler , 1948, Suisse, Pomologie illustrée , p.12 , 13 , vue bas droite (forme la plus typique) - Catalogue Sté pomologique de France , 1927 , p.409 - Le Verger Français , 1947 , p.401 - Alexandre Bivort , Annales de pomologie belge et étrangère voir réédition 1998 , p.581.- Choisel jean-louis étude , coupe.