

REINETTE COING DE CREDE

© Fichier choisel-2001-2008

ORIGINE : Allemagne avant 1819. Leroy à Angers l'a cultivée dès 1870.

SYNONYMES : Crede's Quittenreinette et Credes Quitterenette(Diel, Allemagne, « Kernobstsorten », 1819, t.21, p.105).- et Heidemij, 1868, pl. 48, n°95, « De Nederlandsche Boomguard »Gravure ici).

MATURITE-CONSOMMATION : Octobre-Décembre.

FORME : Moyenne, L=71mm., H=65mm.- Plus haute ou plus large, sphéroïdale ou ovoïde, assez irrégulière.

EPIDERME : Lisse, unicolore, jaune clair. Quelques lenticelles fauves ou noirâtres .Traces fauves.

CUVETTE DU PEDONCULE : Profonde, largeur variable, un peu brun foncé. Parfois gibbeuse.


PEDONCULE : Gros, court ou long, renflé à l'attache, un peu arqué, dépasse ou non du sommet.

CUVETTE DE L'ŒIL : Large(25mm.), profonde, plissée.

ŒIL : Grand ou moyen, clos, duveteux.

CHAIR : Jaunâtre, fine, assez tendre, bien juteuse, bien sucrée, peu parfumée, sans acidulité=douce. Deuxième qualité pour les amateurs de pommes douces.

LOGES à PEPINS : Closes, à peine fendillées ou



feutrées.

Oberdieck.

CARACTERES PARTICULIERS :

OBSERVATIONS :Arbre peu vigoureux . Les rameaux grêles ont de petites lenticelles rares et peu visibles. Yeux très petits, noyés dans l'écorce. Feuilles petites régulièrement crénelées à pétiole gros, long, raide.

REFERENCES :Recherches Choisel Jean-Louis.

BIBLIOGRAPHIE : A.Leroy, Angers, 1873, « Dictionnaire de Pomologie »,n°386(silhouette ici).et Heidemij, déjà cité. Oberdieck, n°317, 1865, Illustrirten.