

REINETTE D'ANGLETERRE BIS

©Fichier choisel 2000



©2002 Pastel choisel.

ORIGINE : Ancienne et inconnue. Retrouvée chez Grisard frères, pépiniéristes à Albertville et à Saint-Sigismond (Savoie). Officialisée par le congrès pomologique de la première moitié du 20^e siècle sur l'intervention de Louis Chasset, 1938.(accepte la forme du type 1 de Leroy, sans plus).

SYNONYMES : Confondue à tort avec Royale d'Angleterre.

MATURITE-CONSOMMATION : Janvier- avril (Chasset), puis février-juin(Sté Pomologique de France, 1947).

FORME : Grosse à très grosse. Souvent un peu plus large que haut, assez régulière au pourtour, mamelonnée au sommet. Conique (type 1 Leroy), asymétrique.

EPIDERME : Jaune paille lavé de rouge brillant à l'insolation avec stries rouge plus foncé un peu comme Reine des reinettes. Lenticelles fines, brunâtres sur toute la surface.

CUVETTE du PEDONCULE : Large, évasée, peu profonde.

PEDONCULE : Court, assez gros.

CUVETTE de L'ŒIL : Evasée, peu profonde, à bords irréguliers avec une partie plus saillante formant mamelon assez large

ŒIL : Largement dégagé, mi clos ou ouvert

CHAIR : Blanc-jaunâtre, un peu veinée de vert jaunâtre à l'intérieur, juteuse, sucrée, parfumée, à bon goût de Reinette, un peu relevée.

OBSERVATIONS : Ressemble beaucoup à Royale d'Angleterre mais est séparée d'elle de six mois d'époque de maturité. Royale d'Angleterre mûrit en octobre-novembre époque à laquelle elle devient cotonneuse. Alors que Reinette d'Angleterre mûrit sitôt après les rois. Port plutôt mi érigé différent de Reinette du Canada qui est retombant.

BIBLIOGRAPHIE : « Le Verger français », t.1, 1947, Sté Pomologique de France, p.404.