

REINETTE D'ARMORIQUE

Fichier ©choisel jean-louis-2001-2012





Vues : photos Choisel ©1991-2012 même pommier



ORIGINE :Inconnue, cultivée en Ile et Vilaine et Bretagne. Le professeur Constant Houlbert, de Rennes, vers les années 1937, à proposé le nom Reinette d'Armorique alors qu'il ignorait que cette variété était appelée De Genêt. Dans son « Dictionnaire de Pomologie »1873, n°104, André Leroy d'Angers, écrit avoir reçu en 1875, de l'école d'agriculture de Grand-Jouan(Loire-Atlantique), une pomme Chailleux dont le berceau lui paraît être Nozay ou environs car on y trouve des pommiers grands comme des chênes. Variété soumise en 1869 à la Sté d'Horticulture de Paris. Or il semblerait que Leroy décrive ici la Reinette d'Armorique « à la forme globuleuse assez régulière(alors que Chailleux connu de nous est de forme conique et irrégulière au pourtour), à l'épiderme jaune d'or, fouetté-réticulé de carmin terne côté insolation(alors que Chailleux connu de nous est tout rouge sombre marbré et réticulé de fauve sur ses joues, en plus de ses cuvettes), marbrée de roux squammeux près de l'œil et du pédoncule et fortement ponctué de gris et brun ».Seule différence la maturité= Octobre à janvier. Il est vrai que plusieurs clones différents doivent exister.

D'après Constant Houlbert, 1937, Reinette d'Armorique est une variété améliorée de la vieille Reinette Vermeille de Bretagne(=Chailleux), tirée de l'oubli vers le milieu du siècle dernier par un horticulteur nantais M.Chailleux.Description Houlbert de Reinette d'Armorique=cavité oculaire très large mais peu profonde ; œil moyen, mi clos ou clos ; épiderme recouvert d'un élégant réseau grisâtre généralement(à noter que l'insolation donne des lavis rouges sur certains fruits, voir photos Choisel). Ayant une variante entièrement vert blanchâtre=Reinette fardée(cavité oculaire plus ou moins large, mais profonde ou assez profonde).

SYNONYMES : De Genet, Reinette de Bretagne. Confondue à tort avec Chailleux qui ; elle, est confondue à tort avec Drap d'Or.

MATURITE-CONSOMMATION : Fin décembre-Mai.(Houlbert)

FORME : Moyenne à assez grosse. Plus large, sphéroïdale un peu aplatie et parfois rétrécie côté œil. Pourtour régulier, parfois un peu anguleux côté cuvette de l'œil.

EPIDERME : Un peu rugueux. Peau dure, épaisse. Jaune d'or recouvert de grisaille réticulée ou marbrée. Pour quelques fruits un peu rouge sombre ou violacé à l'insolation ou plus clair en voile, ou pas coloré (comme description Houlbert, selon position des fruits dans l'arbre). Lenticelles fauves.

CUVETTE du PEDONCULE : Evasée, parfois étroite ; peu profonde, irrégulière, gris-fauve étendu.

PEDONCULE : Court, gros, souvent charnu ou en bouton ; ne dépasse pas ou dépasse de moins un cm. du sommet car bien que court la cuvette est, elle, peu profonde.

CUVETTE de L'ŒIL : Large, évasée, peu profonde ou assez, un peu plissée parfois ; gris réticulé débordant ou squameux en 'tourbillons'

ŒIL : Moyen, clos ou mi clos.

CHAIR : Jaunâtre, bien ferme, croquante, acidulée, juteuse, sucrée à saveur de Reinette.

LOGES à PEPINS : Un peu fendillées-feutrées, closes ou peu ouvertes, plus hautes.

OBSERVATIONS : Arbres de moyenne ou forte vigueur. Rameaux longs comme le Genet. Port retombant. Floraison tardive (fin mai).

REFERENCES : -Choisel.© 1991-2012

BIBLIOGRAPHIE: voir texte.