



REINETTE DE CAUX

© fichier choisel 2001

ORIGINE : Importée de Hollande , vers 1771 , par un anglais de Norwich. Elle porte donc mal son nom. Encore vendue chez A.Leroy d'Angers en 1916 et 1935.

SYNONYMES : Grosse Reinette Rouge Tiquetée (Poiteau et Turpin , 1807) - Dutch Mignonne (George Lindley , 1831) - De Laak (d°) - Paternoster (d°) - Copmanthorpe Crab (Thompson , 1842) - Stettin Pippin (d°) - Vermillon d'Andalousie (André Leroy , Angers , 1851) -Duitsch Mignonne (Alexandre Bivort , 1853 , Annales de pomologie...) - Reinette Impératrice (André Leroy , 1863).- Reinette Dorée de Hollande - Reinette Dorée Allemande , à tort - (Kessler, 1945 ,Pomologie Illustrée (vue couleur ici) Décrite également par Mas , Le Verger , n°1 , T.4.1868.

NE PAS confondre avec GROSSE REINETTE DE CASSEL par les synonymes.

MATURITE-CONSOMMATION : Octobre-Avril;

FORME : Moyenne à grosse. Plus large , variable en forme mais souvent sphéroïdale et , parfois un peu rétrécie côté cuvette de l'œil(conique) . Pourtour régulier (Kessler signale des côtes faiblement marquées).

EPIDERME : Lisse (Kessler = rude , sèche , dure) , à fond jaune d'or (Leroy) , ou jaune-vert (Kessler) , lavé panaché , à l'insolation , de carmin plus ou moins foncé (Leroy) , marbré et strié de rouge sale sur 0 à 1/2 (Kessler). Très ponctué de gris clair et brun (Leroy) , points bruns de grosseur moyenne , certaines rayonnants (donc anguleuses)(Kessler) . Assombri par un réseau de rouille grossière et réticulée (Kessler). Les lenticelles ne sont pas toujours évidentes.

CUVETTE du PEDONCULE : Largeur variable (Leroy) , profonde , fauve squameux peu dépassant.

PEDONCULE : Assez gros ou moins , long ou moyen , renflé à l'attache , dépasse le sommet .

CUVETTE de L'ŒIL : Etroite et peu profonde (Kessler) , vaste(Leroy et Sté pomologique de France , catalogue 1927 et Verger Français , 1947 , p.405) , profondeur variable. Souvent

tachée de gris . Unie ou un peu plissée ou même un peu de côtes qui partent le long du fruit (sur les joues).

L'ŒIL : Grand à moyen (10-12mm.) , mi clos.

CHAIR : Jaunâtre à maturité, quelques filaments verts, (verdâtre jaune = Kessler . Il a dû observer avant complète maturité)) , fine , ferme , juteuse , sucrée , sur-acidulée (Kessler = très acide) , (Leroy = acidulée) , (Sté Pomologique = vineuse).

LOGES à PEPINS :Grosses , un peu fendillée-feutrées , closes.

OBSERVATIONS : Lenticelles sur bois de 2 ans grandes, très nombreuses(Leroy) , petites et nombreuses(Sté Pomologique...).

REFERENCES : Choisel jean-louis©1978-2001 et coupe. Celles citées dans le texte.

BIBLIOGRAPHIE : A.Leroy , Angers , 1873 , Dictionnaire de Pomologie , n°384. - H.Kessler , Suisse , 1945 , Pomologie Illustrée. Et ouvrages cités dans le texte.