


REINETTE D'AMPTEZIEU

Fichier Choisel.



Willermoz, 1863, v.1, Pomologie de la France.

ORIGINE : Depuis longtemps cultivée à Demptézieu, commune de Saint-Savin en Isère , première citation en 1868 .Répandue par m.Baboud aîné, de Thoissey dans l'Ain. Protégée à Brogdale sous le synonyme de Reinette d'Anthézieux (the Book of Apples, 1993, p.251).

SYNONYMES : Musi, Reinette Baboud, Reinette Menoux, Reinette d'Anthézieux.



Photo A.Rouèche.

MATURITE-CONSOMMATION : Décembre-Mars.

FORME : Grosse, L=85mm., H=85mm.- H=L ou plus large, conique, côtelé aux deux pôles.

EPIDERME : Fin, lisse, mince, jaune, un peu voilé de rose saumon. Lenticelles grises très apparentes.

CUVETTE du PEDONCULE : Evasée, profonde, régulière, voilée de gris fauve.

PEDONCULE : Gros, à moyen, longueur moyenne, dépasse rarement le sommet, mais parfois oui(ici exemple photo).

CUVETTE de L'ŒIL : Etroite à large, moyen profond à profonde, entourée de mamelons irréguliers.

ŒIL : Grand, ouvert, ou mi clos.

CHAIR : Blanchâtre ou blanc jaunâtre, tendre, ou mi tendre, mi fine, moelleuse, sucrée, juteuse, acidulée, parfumée, bonne.

LOGES à PEPINS : Allongées, grandes.

CRITERE SPECIAL:

OBSERVATIONS : Arbre très vigoureux à gros rameaux rouge olivâtre au nombreuses et petites lenticelles. Yeux petits, apprimés. Epoque de floraison moyenne. Beaucoup de boutons à fruits sont mal constitués.

REFERENCES :C hoisel .

BIBLIOGRAPHIE : J.Vercier, 1934.- Le Verger Français, 1947, t.1, p.408 . Catalogue de la Sté Pomologique de France, 1927, p.415 (silhouette ici ainsi que celle, la même, de Nomblot , sans date). Vue couleurs : Willermoz, vol.1,1863,Pomologie de la France.