

REINETTE DE JAGER. (THOMAS Guide Pratique, 19° s.).

Fichier Choisel jean-louis-©2005-2008



W.Lauche Deutsche Pomologie 1882/83.

ORIGINE : Allemande. Introduite près d'Aix-la-Chapelle. Etudiée en réunion pomologique en Allemagne en 1877.

SYNONYMES : Jager's Reinette (allemand Oberdieck).

MATURITE-CONSOMMATION : Novembre-avril.

FORME : Moyenne. Plus large, paraissant un peu conique mais plutôt sphéroïdale. Pourtour assez régulier. Certains exemplaires sont très asymétriques côté cuvette pédoncule (une joue plus haute que l'autre, voir croquis à loges).

EPIDERME : Rugueuse à lisse, fine, onctueuse à bonne maturité, reste verdâtre par endroits assez longtemps puis devient jaune. Eventuel lavis fauve (d'où la rugosité). Lenticelles grosses, anguleuses, nombreuses.

CUVETTE du PEDONCULE : Mi large, profonde, un peu irrégulière au pourtour.


PEDONCULE : Gros, court, ne dépasse pas ou plus fin et dépasse.

CUVETTE de L'ŒIL : Moyenne ; profonde ou mi profonde, à peine plissée ou non.

L'ŒIL : Gros, ouvert.

CHAIR : Blanc jaunâtre ou verdâtre, fine, tendre, juteuse, sucrée, savoureuse.

CRITERE SPECIAL :



LOGES : Très feutrées, closes à très ouvertes, très grosses.

OBSERVATIONS :

REFERENCES : Choisel.

BIBLIOGRAPHIE : Voir plus haut. Oberdieck, n°658, 1875, Illustrirten.