


REINETTE DE POMPHELIA

©2002-2007 Fichier choisel



(W.Lauche, 1882,n°92-collection privée).

ORIGINE : Anglaise avant 1804. Propagée depuis l'Angleterre en Hollande, puis Allemagne par Joseph Kirke pépiniériste à Brompton près Londres. Cultivée en France par les pépinières Leroy d'Angers jusqu'aux environs de 1916.

SYNONYMES : Pomphélia's Rothe reinette(Diel, Allemagne, 1819)- Pomphélias Reinette(W.Lauche, Allemagne, 1882).

MATURITE-CONSOMMATION : Décembre-Mars.

FORME : Plus que moyenne. Plus large, globuleuse pour A.Leroy, conique pour Lauche. Pourtour régulier.

EPIDERME : Lisse, jaune pâle amplement marbré, lavé, strié de carmin foncé pour Leroy. Pour Lauche voir vue couleur. Lenticelles nombreuses blanches, grises, rouges.

CUVETTE du PEDONCULE : Large, évasée, très profonde, très fauve.

PEDONCULE : Gros, très court.

CUVETTE de L'ŒIL : Dimensions moyennes, unie (Leroy), plissée(Lauche).

L'ŒIL : Grand, clos.

CHAIR : Jaunâtre, mi tendre, mi fine, juteuse, sucrée, acidulée, bien savoureuse.



LOGES à PEPINS : Hautes, larges, closes, bien feutrées.

Diel

OBSERVATIONS : Lenticelles sur rameaux petites, rondes, nombreuses.

REFERENCES : Choisel

BIBLIOGRAPHIE : A.Leroy, Angers, 1873, Dictionnaire de Pomologie, n°434 et silhouette-
W.Lauche, Deutsche Pomologie, 1882, n°92.