



# REINETTE DES CARMES

©2002-2007-fichier choisel.

Leroy



Edouard Lucas 1858 Monatshefte. Carmeliter Reinette.



Lauche.

**ORIGINE :** France , avant 1667. Ancienne reinette Rousse rebaptisée , vers 1770 , REINETTE DES CARMES .Autrefois cultivée dans la région parisienne , en Anjou chez A.Leroy , en Allemagne , Belgique , Angleterre , Amérique ; Conservée à Brogdale (the book of apples , 1993 , p.252).Encore diffusée , en Europe ,entre 1916 et 1930 par les pépinières Leroy d'Angers. Vendue chez Nombrot-Bruneau dans les années 1930 à Bourg-la-Reine. Reinette Rousse est un nom qui fut donné également à Reinette Dorée, Reine des Reinettes.

**SYNONYMES :** Reinette Rousse (Merlet , 1667 et les Chartreux de Paris, 1775)- Carmeliter reinette(Diel , allemand , 1799 et W.Lauche ,Deutsche Pomologie , Berlin , 1882/83 , n°29 gravure ici) - Reinette Truite(Van Mons , belge , 1798/1823) - Glace Rouge(George Lindley , Londres , 1831) - Kleiner Casseler Reinette(d°) - Pearmain Barcelona(d°) - Reinette Rouge(d°) - Forellen Reinette(Diel , 1833)- Speckled Golden Reinette(Thompson, Londres , 1842) - Polinia Parmane(Lucas , allemand , 1859) - Reinette Truitée(d°) - Speckled Parmane(d°) - Cassel Reinette , ne pas confondre avec Grosse Reinette de Cassel (Charles Downing, Amérique , 1869). ...etc.

**REMARQUES :**Diels et Lucas, 1855 n°139 font une confusion à moins que ce ne soit Leroy : Les premiers décrivent bien Reinette des Carmes à loges lisses et également REINETTE de BRETAGNE , à loges bien feutrées, avec synonymes : Reinette rouge des Carmes, Reinette Truitée que Leroy donne pour REINETTE DES CARMES.....Lauche donne une loge feutrée pour elle.....

**MATURITE-CONSOMMATION :** Novembre-Mars.

**FORME :** Sur moyenne ou moins. Deux types : L=76, H= 71mm pour type 1 conique - L=65, H=55mm, pour type 2 sphéroïdal- Plus large , ou conique ou sphéroïdale aplatie aux deux pôles; asymétrique surtout pour le type conique.

**EPIDERME :** Un peu rugueux, à fond jaune sale, réticulé et marbré de roux côté ombre, légèrement lavé et fouetté(stries) de rouge-brun à l'insolation ou il y a des lenticelles grisâtres. Autres lenticelles sur la partie rousse, et, probablement, grosses et anguleuses, selon vue de Lauche ici.

**CUVETTE du PEDONCULE :** Etroite, profonde, grise, irrégulière, peut être dû à une gibbosité.

**PEDONCULE :** Grosseur moyenne, long ou court, dépasse le sommet ou non.

**CUVETTE de L'ŒIL :** Large (28mm), profonde, unie ou un peu plissée, peut être traces grises.

**L'ŒIL :** Grand, ouvert ou mi clos, cotonneux.

**CHAIR :** Blanchâtre ou jaunâtre, fine ou mi fine, tendre, très sucrée, acidulée, parfumée ,délicieuse. Egalement pour cidre.

**LOGES à PEPINS :** Moyennes, en goutte d'eau, feutrées, closes (selon Lauche). Selon Diel et



Lucas : closes, lisses : Diel.

**CARACTERES PARTICULIERS :** Peut-être gibbosité dans cuvette du pédoncule.

**OBSERVATIONS :** Bois de faible vigueur, aux lenticelles clairsemées, de moyenne grosseur . Feuilles petites, ovales ou arrondies, profondément dentelées, à long pétiole fin, rigide à forte cannelure.

**REFERENCES :** **BIBLIOGRAPHIE :** A.Leroy, Angers , 1873 , Dictionnaire de Pomologie , n°382 , silhouettes ici - Lauche déjà cité.  
Catalogue de la Sté pomologique de France, 1927, p.420.Et auteurs cités plus haut.